



Tecnologia e Ciência:

Sempre presentes em nossos processos para levarmos o melhor a vocês!

BELFAR:
DEDICAÇÃO
QUE GERA
SAÚDE



A Belfar é uma indústria farmacêutica com 46 anos de atuação em todo o Brasil.

Sua fábrica fica situada em Belo Horizonte. A empresa tem um vasto portfólio de produtos de diferentes apresentações. A Belfar trabalha com a Linha MIP (Medicamentos Isentos de Prescrição), além de medicamentos Similares e Genéricos de venda sob prescrição médica que atendem diversas áreas terapêuticas. A Belfar comercializa seus produtos em todos os estados do país. O principal objetivo da Belfar é expandir a atuação no mercado farmacêutico e aumentar o número de medicamentos para satisfazer e cuidar com vigor de toda a família.

Todos os anos, a Belfar é inspecionada pela ANVISA e apresenta excelentes resultados. Esses resultados garantem certificação da empresa em BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. Dessa forma, a Belfar avaliza os seus clientes e os seus consumidores, além de reforçar o máximo de cuidado em cada etapa de produção.

A empresa valoriza sempre a parceria com farmácias e distribuidores, para que juntos possam alcançar crescimento e espaço no mercado brasileiro.

Assim é a Belfar: tradicional, quando o assunto é qualidade; exigente e contemporânea, quando a intenção é servir com eficácia!

BACINA

bacitracina 250UI/g
+ sulfato de neomicina 5mg/g

ANTIBIÓTICO TÓPICO

Registro M.S. 1.0571.0082

INDICAÇÕES:

Tratamento de infecções da pele, ferimentos e queimaduras.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis à neomicina, aos antibióticos aminoglicosídeos e aos outros componentes da fórmula. Este medicamento é contraindicado para bebês prematuros, recém-nascidos e lactantes.

APRESENTAÇÕES:

Pomada – Bisnagas com 10g e 15g



BELCOMPLEX

complexo B

POLIVITAMÍNICO

COMPRIMIDOS

Registro M.S. 1.0571.0151

SOLUÇÃO ORAL E XAROPE

Registro M.S. 1.0571.0005

INDICAÇÃO:

Suplemento vitamínico.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis aos componentes da fórmula

APRESENTAÇÕES:

Comprimido revestido – Frasco com 50 comprimidos

Solução oral – Frasco gotejador com 30mL

Xarope – Frasco com 100mL



BELFAREN

diclofenaco sódico 10mg/g

ANTI-INFLAMATÓRIO

Registro M.S. 1.0571.0120



INDICAÇÕES:

Tratamento tópico de inflamações causadas por entorses, luxações e contusões.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis ao diclofenaco ou a qualquer outro componente da fórmula.

APRESENTAÇÃO:

Gel dermatológico – Bisnaga com 60g



BELMIRAX

mebendazol

ANTIPARASITÁRIO

Registro M.S. 1.0571.0032

INDICAÇÕES:

Tratamento das verminoses provocadas por infestações isoladas ou mistas.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis ao mebendazol ou aos outros componentes da fórmula.

APRESENTAÇÕES:

Comprimido 100mg – Caixa com 6 comprimidos
Suspensão oral 20mg/mL – Frasco com 30mL

BELGLÓS

óxido de zinco 100mg/g
+ vitamina A 1000UI/g + vitamina D 400UI/g

SECATIVO TÓPICO/ CICATRIZANTE

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO
SIMPLIFICADA RDC ANVISA
Nº 199/2006 – AFE Nº 1.00571.1.

INDICAÇÕES:

Prevenção e tratamento das
assaduras e brotoejas.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis a qualquer
componente da fórmula.

APRESENTAÇÃO:

Pomada – Biscnaga com 45g



CALSOL

óxido de zinco 25% + calamina 10%

SECATIVO E ANTIPRURIGINOSO LEVE

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO
SIMPLIFICADA RDC ANVISA
Nº 199/2006 – AFE Nº 1.00571.1.

INDICAÇÕES:

Antisséptico e secativo, adstringente e antipruriginoso leve.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis a qualquer componente da fórmula.

APRESENTAÇÃO:

Pasta – Frasco com 100ml

BELSPAN COMPOSTO

dipirona sódica + butilbrometo de escopolamina

ANTIESPASMÓDICO/ANALGÉSICO

Registro M.S. 1.0571.0107



INDICAÇÕES:

Dor, desconforto abdominal e cólicas.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis ao butilbrometo de escopolamina, à dipirona ou a outros derivados pirazolônicos ou a qualquer outro componente da fórmula. É contraindicado a partir dos 6 meses de gravidez.

APRESENTAÇÕES:

Comprimido revestido (butilbrometo de escopolamina 10mg + dipirona 250mg) – Caixas com 20, 200, 500 e 1000 comprimidos

Solução oral (butilbrometo de escopolamina 6,67mg/mL + dipirona 333,4mg/mL) – Frasco gotejador com 20mL



DRY TENNIS

mentol 1%

TALCO MENTOLADO

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO
SIMPLIFICADA RDC ANVISA
Nº 199/2006 – AFE Nº 1.00571.1.

INDICAÇÃO:

Dermatoses pruriginosas.

ADVERTÊNCIA:

Cuidados ao manusear, evitar inalação, pois pode desencadear quadros de irritação e até lesões pulmonares mais graves.

APRESENTAÇÃO:

Pó – Frasco com 100g



DERMOLIMP

ácido salicílico 2% - 20mg/g

ANTISSÉPTICO/ESFOLIANTE TÓPICO

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO
SIMPLIFICADA RDC ANVISA
Nº 199/2006 - AFE 1.00571.1

INDICAÇÕES:

A ação queratoplástica permite a descamação da pele, favorecendo uma eficiente ação antisséptica sobre o microrganismo causador da acne.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis aos componentes da fórmula.

APRESENTAÇÃO:

Pomada – Bisnaga com 30g

BOLDO BELFAR

Peumus boldus Molina 0,1 mL/mL

FITOTERÁPICO SIMPLES -DIGESTIVO

Registro M.S 1.0571.0143



INDICAÇÕES:

Em casos de mal-estar associado a excessos alimentares e/ou má digestão, flatulência e distúrbios gastrintestinais, como espasmos e contrações nas partes inferiores do abdômen.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis a qualquer um dos componentes da fórmula, por crianças menores de 6 anos, mulheres grávidas ou em período de amamentação, em casos de obstrução das vias biliares, cálculos biliares, infecções ou câncer no ducto biliar e câncer no pâncreas e doenças severas do fígado, como hepatite viral, cirrose e hepatite tóxica.

APRESENTAÇÕES:

Solução oral

Caixas com 12 e 60 flaconetes com 10mL

Frasco com 100mL



FLUIDELAN

iodeto de potássio 2%

EXPECTORANTE

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO

SIMPLIFICADA RDC ANVISA

Nº 199/2006 - AFE Nº 1.00571.1.

INDICAÇÕES:

Expectorante e mucolítico.

ADVERTÊNCIA:

Restrição ao uso em gestantes, crianças e portadores de distúrbios da tireoide. Não administrar em portadores de diabetes mellitus.

APRESENTAÇÃO:

Xarope 20mg/mL – Frasco com 100mL

FLATICONA

simeticona

ANTIPLATULENTO

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO

SIMPLIFICADA RDC ANVISA

Nº 199/2006 - AFE Nº 1.00571.1.

INDICAÇÕES:

Estufamento, estômago pesado, inchaço abdominal, dores e cólicas intestinais.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis a qualquer componente da fórmula.

APRESENTAÇÕES:

Comprimido 40mg – Caixa com 20 comprimidos

Emulsão gotas 75mg/mL - Frasco com 10mL, 15mL e 20mL



CASTANHA DA ÍNDIA

Aesculus hippocastanum L. 100mg

**FITOTERÁPICO SIMPLES
ANTIVARICOSO DE AÇÃO SISTÊMICA**

Registro M.S. 1.0571.0138



INDICAÇÕES:

Tratamento de sintomas da insuficiência venosa, como sensação de dor e peso nas pernas, inchaço, câibras e prurido, e fragilidade capilar.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis a escina, a extratos de *A. hippocastanum* ou a qualquer um dos componentes da fórmula e pacientes com insuficiência renal ou hepática. O medicamento também é contraindicado para uso por crianças.

APRESENTAÇÃO:

Comprimido revestido – Caixa com 60 comprimidos



GASTROINTESTIN

hidróxido de alumínio 6%

ANTIÁCIDO

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO

SIMPLIFICADA RDC ANVISA

Nº 199/2006 – AFE Nº 1.00571.1.

INDICAÇÕES:

Coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e esofagite de refluxo.

ADVERTÊNCIA:

Obstipante (causa constipação e prisão de ventre).

APRESENTAÇÃO:

Suspensão oral – Frasco com 240mL

GASTROINTESTIN PLUS

hidróxido de alumínio 6%
hidróxido de magnésio 4%

ANTIÁCIDO

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO

SIMPLIFICADA RDC ANVISA

Nº 199/2006 – AFE Nº 1.00571.1.

INDICAÇÕES:

Coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e esofagite de refluxo.

APRESENTAÇÃO:

Suspensão oral – Frasco com 240mL



GLICERILAX

glicerol

SUPOSITÓRIO

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO

SIMPLIFICADA RDC ANVISA

Nº 199/2006 – AFE Nº 1.00571.1.



INDICAÇÃO:

Laxante natural.

ADVERTÊNCIA:

O supositório pode ser umedecido com água antes da inserção para reduzir a tendência inicial da base de retirar água das mucosas evitando a irritação dos tecidos.

APRESENTAÇÕES:

Supositório de glicerina 1g (Lactente) – Caixa com 6 supositórios
Supositório de glicerina 1,5g (Pediátrico) – Caixa com 6 supositórios
Supositório de glicerina 2,5g (Adulto) – Caixa com 6 supositórios

COLPADAK

nitrato de miconazol 20mg/g

ANTIFÚNGICO
Registro M.S. 1.0571.0019

INDICAÇÕES:

Infecções de pele e unha, devido a dermatófitos ou leveduras e pé de atleta.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis aos componentes da fórmula.

APRESENTAÇÕES:

Creme dermatológico – Bisnaga com 28g

Loção – Frasco com 30mL

Pó tópico – Frasco com 30g





GARGOJUICE

cloridrato de benzidamina

ANTI-INFLAMATÓRIO/ ANESTÉSICO/ANALGÉSICO

Registro M.S. 1.0571.0007



INDICAÇÕES:

Dor e irritação na garganta, amigdalites, faringites.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis à benzidamina ou a qualquer componente da fórmula. É contra indicado para menores de 6 anos.

APRESENTAÇÕES:

Pastilha 3mg – Caixa com 12 pastilhas
Colutório 1,5mg/mL - Frasco spray com 30mL

GUACO BELFAR

Mikania glomerata Sprengl.
0,0583mL/mL.

FITOTERÁPICO SIMPLES EXPECTORANTE/BRONCODILATADOR

Registro M.S. 1.0571.0144

INDICAÇÕES:

Auxilia na dilatação dos brônquios e na eliminação das secreções respiratórias por meio da tosse.

CONTRAINDICAÇÃO:

Pacientes sensíveis aos componentes da fórmula.

APRESENTAÇÃO:

Solução oral – Frasco com 100mL



GUACO BELFAR

Mikania glomerata Sprengl.
0,0583mL/mL.

FITOTERÁPICO SIMPLES EXPECTORANTE/BRONCODILATADOR

Registro M.S. 1.0571.0144

INDICAÇÕES:

Auxilia na dilatação dos brônquios e na eliminação das secreções respiratórias por meio da tosse.

CONTRAINDICAÇÃO:

Pacientes sensíveis aos componentes da fórmula.

APRESENTAÇÃO:

Xarope – Frascos com 100mL

DELTAPIL

deltametrina 0,2mg/mL

ANTIPARASITÁRIO

Registro M.S. 1.0571.0081



INDICAÇÕES:

Tratamentos da pediculose (piolhos), da ftiíase (chatos), da escabiose (sarna) e das infestações por carrapatos.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis à deltametrina, alergia respiratória e lesões da pele como feridas e queimaduras ou condições que possibilitem maior absorção.

APRESENTAÇÕES:

Loção – Frasco com 100mL

Shampoo – Frasco com 100mL



GRETIVIT

POLIVITAMÍNICO/POLIMINERAL

Registro M.S. 1.0571.0009

INDICAÇÃO:

Suplemento vitamínico e mineral.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis aos componentes da fórmula. Em caso de hipervitaminose A e/ou D e insuficiência renal grave.

APRESENTAÇÃO:

Comprimido revestido – Frasco com 30 comprimidos



HEMOPROCT

Hamamelis virginiana L. 50mg/g

**FITOTERÁPICO SIMPLES
ANTI-INFLAMATÓRIO/
ANTI-HEMORROIDAL**

Registro M.S. 1.0571.0142

INDICAÇÕES:

Proporciona alívio e conforto aos sintomas das hemorroidas e equimoses.

CONTRAINDICAÇÃO:

Pacientes sensíveis e alérgicos a qualquer componente da fórmula.

APRESENTAÇÃO:

Pomada – Bisnaga com 30g + aplicador retal

DERMOTRIZOL

clotrimazol 1%

ANTIFÚNGICO

Registro M.S. 1.0571.0097



INDICAÇÃO:

Micoses.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis ao clotrimazol ou a qualquer componente da fórmula.

APRESENTAÇÕES:

Creme – Bisnaga com 20g

Solução dermatológica - Frasco gotejador com 30mL

Solução dermatológica – Frasco spray com 20mL

KALICID

Colódio Lacto Salicilado
ácido láctico 0,15mL/mL
+ ácido salicílico 0,20g/mL

ANTIVERRUCOSO

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO
SIMPLIFICADA RDC ANVISA
Nº 199/2006 – AFE Nº 1.00571.1.

INDICAÇÕES:

Verrugas comuns, plantar e calosidades.

CONTRAINDICAÇÕES:

Diabéticos e pacientes com déficit
circulatório em membros.

ADVERTÊNCIAS:

Não usar próximo aos olhos. Evitar o
contato com as mucosas e a pele íntegra.

APRESENTAÇÃO:

Solução tópica – Frasco com 10mL



LEITE DE MAGNÉSIA BELFAR

hidróxido de magnésio 8%

ANTIÁCIDO / LAXANTE SUAVE

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO
SIMPLIFICADA RDC ANVISA
Nº 199/2006 - AFE 1.00571.1

INDICAÇÕES:

Antiácido e laxante suave.

PRECAUÇÕES:

Não ingerir, durante a gravidez ou se estiver
amamentado sem orientação médica.
Como laxativo, não usar em presença de dor
abdominal, náuseas, vômitos, alteração nos
hábitos intestinais por mais de 2 semanas,
sangramento retal e doença renal. Como
antiácido, pode haver efeito laxativo.

APRESENTAÇÕES:

Suspensão oral – Frascos com 120mL e 240mL

DRENOGRIP

caféina 30mg + maleato de clorfeniramina
2mg + dipirona 500mg

ANTIGRIPAL

Registro M.S. 1.0571.0006



INDICAÇÃO:

Contra os sintomas da gripe.

CONTRAINDICAÇÃO:

Pacientes sensíveis aos componentes da fórmula.

APRESENTAÇÕES:

Comprimido revestido – Caixa com 12 e 120 comprimidos



NASOFAR INFANTIL

cloreto de sódio 0,9%

FLUIDIFICANTE/ DESCONGESTIONANTE

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO

SIMPLIFICADA RDC ANVISA

Nº 199/2006 - AFE 1.00571.1

INDICAÇÕES:

Fluidificante e descongestionante nasal.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis aos componentes da fórmula. Não deve ser utilizado por pacientes com hipersensibilidade ao cloreto de benzalcônio.

APRESENTAÇÃO:

Solução nasal – Frasco com 30mL

NASOFAR

cloreto de sódio 3% - 30mg/mL

FLUIDIFICANTE/UMIDIFICANTE

Registro 1.0571.0036

INDICAÇÕES:

Fluidificante e umidificante.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis aos componentes da fórmula. É contraindicado para menores de 3 anos.

APRESENTAÇÃO:

Solução nasal – Frasco spray com 60mL



GELMINEX

salicilato de metila 40mg/g
+ cânfora 10mg/g
+ *Atropa belladona* 13,6mg/g

**ANALGÉSICO/
ANTI-INFLAMATÓRIO TÓPICO**

Registro M.S. 1.0571.0099



INDICAÇÕES:

Sedativo nas contusões e nas luxações.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis aos componentes da fórmula.
É contraindicado para menores de 6 anos.

APRESENTAÇÃO:

Gel dermatológico – Bisnaga com 20g

PASTA D'ÁGUA MENTOLADA

óxido de zinco 25% + mentol 0,5%

SECATIVO TÓPICO

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO
SIMPLIFICADA RDC ANVISA
Nº 199/2006 - AFE Nº 1.00571.1.

INDICAÇÕES:

Antisséptico, secativo e cicatrizante. Ação refrescante.

ADVERTÊNCIA:

Agitar antes de usar.

APRESENTAÇÃO:

Pasta – Bisnaga com 80g



PASTA D'ÁGUA

óxido de zinco 25%

SECATIVO TÓPICO

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO
SIMPLIFICADA RDC ANVISA
Nº 199/2006 - AFE 1.00571.1.

INDICAÇÕES:

Antisséptico, secativo, cicatrizante.

ADVERTÊNCIA:

Agitar antes de usar.

APRESENTAÇÃO:

Pasta – Bisnaga com 80g



HIDROTEN

cloreto de sódio 3,5g + cloreto de potássio 1,5g + citrato de sódio di-hidratado 2,9g + glicose 20,0g

SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO

SIMPLIFICADA RDC ANVISA

Nº 199/2006 - AFE Nº 1.00571.1.



INDICAÇÕES:

Reidratação e manutenção da hidratação.

CONTRAINDICAÇÕES:

Em casos de íleo paralítico, obstrução ou perfuração intestinal e vômitos incoercíveis.

APRESENTAÇÕES:

Pó – Caixa com 4 e 6 envelopes de 27,9g

Pó sabor laranja – Caixa com 6 envelopes de 28,02g

Pó sabor menta – Caixa com 6 envelopes de 27,98g

ÓLEO MINERAL

óleo mineral

LAXANTE

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO
SIMPLIFICADA RDC ANVISA
Nº 199/2006 - AFE Nº 1.00571.1.

INDICAÇÕES:

Como laxante suave e para pele ressecada e áspera. Laranja: como laxante.

CONTRAINDICAÇÕES:

Deve-se evitar o uso na presença de náuseas, vômitos, dor abdominal, gravidez, dificuldade de deglutição, refluxo gastroesofágico e em pacientes acamados. Esse medicamento é contraindicado para menores de 6 anos.

APRESENTAÇÕES:

Frasco com 100mL - Sem cheiro e sem gosto.



PIOSAN

permetrina 0,01g/mL

ANTIPARASITÁRIO

Registro M.S. 1.0571.0035

INDICAÇÕES:

Mata piolhos e lêndeas e previne a reinfestação.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não usar em crianças abaixo de 2 anos de idade. Piosan é contraindicado em pessoas que apresentam hipersensibilidade à permetrina bem como as piretrinas em geral. Não usar durante a gravidez nem a amamentação, a não ser com prescrição médica.

APRESENTAÇÃO:

Loção – Frasco com 60mL + Pente fino

MICOSBEL

tiabendazol 50mg/g

PARASITICIDA

Registro M.S. 1.0571.0012



INDICAÇÕES:

No tratamento de escabiose e de larva migrans cutânea. O tiabendazol tópico tem sido eficaz no tratamento de micoses superficiais produzidas por dermatófitos comuns.

CONTRAINDICAÇÃO:

Pacientes sensíveis aos componentes da fórmula.

APRESENTAÇÕES:

Loção – Frasco com 30mL

Pomada dermatológica– Bisnaga com 30g

Sabonete – Embalagem com 75g

POMICINA

sulfato de neomicina 5,0mg/g

ANTIBIÓTICO TÓPICO

Registro M.S. 1.0571. 0040



INDICAÇÕES:

Doenças de pele infectadas, queimaduras infectadas, cortes, úlceras na pele, impetigo, furúnculos e infecções na parte de fora da orelha.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não deve ser usado por pacientes que tenham alergia à neomicina, aos antibióticos aminoglicosídeos e a qualquer componente da fórmula.

APRESENTAÇÃO:

Pomada dermatológica – Bisnaga com 20g

PARAMOL

paracetamol

ANALGÉSICO/ANTITÉRMICO

Registro M.S. 1.0571.0133



INDICAÇÕES:

Contra dor e febre.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis ao paracetamol ou a qualquer componente da fórmula. Paramol comprimido é contraindicado para menores de 12 anos.

APRESENTAÇÕES:

Comprimido 750mg – Caixas com 20 e 200

Solução oral 200mg/mL – Frasco gotejador com 15mL



VIRTIODINE

iodopovidona 10%

ANTISSÉPTICO TÓPICO

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO

SIMPLIFICADA RDC ANVISA

Nº 199/2006 - AFE 1.00571.1

INDICAÇÃO:

Antisséptico tópico.

RESTRIÇÕES DE USO:

Neo-natais e gestantes, pois pode causar intoxicação pelo iodo. Evitar uso prolongado. Em caso de ingestão acidental, tomar bastante leite ou clara de ovo batida em água.

ADVERTÊNCIA:

O Produto não deve ser usado em casos de alergia ao iodo, feridas abertas (pode resultar em absorção do iodo) e em curativos oclusivos.

APRESENTAÇÃO:

Solução aquosa – Frasco spray com 60mL

VIRTIOATE

digliconato de clorexidina 1%

ANTISSÉPTICO TÓPICO

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO

SIMPLIFICADA RDC ANVISA

Nº 199/2006 - AFE 1.00571.1

INDICAÇÃO:

Antisséptico tópico.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis à clorexidina ou a qualquer componente da fórmula.

ADVERTÊNCIA:

Evitar contato com os olhos, ouvidos e boca. Para os casos de contaminação dessas partes, lavar abundantemente com água.

APRESENTAÇÕES:

Solução tópica – Frasco gotejador com 30mL

Solução tópica – Frasco spray com 45mL



PROMERGAN

prometazina 20mg/g

ANTIALÉRGICO

Registro M.S. 1.0571.0132



INDICAÇÕES:

Pruridos de várias etiologias, picadas de insetos e processos alérgicos tópicos.

CONTRAINDICAÇÕES:

Dermatoses infectadas ou irritadas, eczema e lesões exsudativas. Em casos de sensibilidade à prometazina ou a qualquer componente da fórmula. É contraindicado para menores de 2 anos.

APRESENTAÇÃO:

Creme dermatológico – Bisnaga com 30g

SULFERBEL

ANTIANÊMICO

Registro M.S. 1.0571.0004



INDICAÇÕES:

Tratamento e profilaxia da anemia por deficiência de ferro.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis aos sais de ferro ou a qualquer componente da fórmula e em casos de úlceras gastroduodenais, insuficiência hepática, tuberculose ativa e gastroenterites.

APRESENTAÇÕES:

Comprimido revestido 50mg – Caixa com 50 comprimidos

Solução oral 125mg/mL – Frasco gotejador com 30mL

Xarope 25mg/mL – Frasco com 100mL

SULFERBEL 40mg

de ferro elementar
sulfato ferroso 200mg

ANTIANÊMICO

Registro M.S. 1.0571.0004



INDICAÇÕES:

No tratamento e na profilaxia da anemia por deficiência de ferro.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis aos sais de ferro ou a qualquer componente da fórmula e em casos de úlceras gastroduodenais, insuficiência hepática, tuberculose ativa e gastroenterites.

APRESENTAÇÕES:

Comprimido revestido 40mg – Caixa com 50, 500 e 1000 comprimidos

**COMPROMISSO
COM A QUALIDADE
EM PRIMEIRO
LUGAR.**







**800mg
+ 160mg**
10 comprimidos

**400mg
+ 80mg**
20 comprimidos

BELFACTRIM e BELFACTRIM F

sulfametoxazol + trimetoprima

ANTIBIÓTICO

Registro M.S. 1.0571.0130

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA

INDICAÇÕES:

Infecções causadas por germes sensíveis aos compostos do produto.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes com doença grave no fígado e no rim, alérgicos à sulfonamidas ou à trimetoprima; em pacientes com sérias alterações hematológicas (no sangue); pacientes portadores de deficiência de G6PD (desidrogenase de glicose 6 fosfato), salvo em casos de extrema necessidade e em doses mínimas. Não deve ser utilizado em combinação com dofetilida.

APRESENTAÇÕES:

Comprimido 800mg + 160mg – Caixa com 10 comprimidos
Comprimido 400mg + 80mg – Caixa com 20 comprimidos

BELFAREN

diclofenaco sódico 50mg

ANTI-INFLAMATÓRIO

Registro M.S. 1.0571.0120

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA



INDICAÇÕES:

Tratamento de formas degenerativas e inflamatórias de reumatismo, reumatismo não-articular, crises agudas de gota, inflamações pós-traumáticas e pós-operatórias dolorosas. Infecções de ouvido, nariz e garganta.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis ao diclofenaco sódico ou a qualquer componente da fórmula. Reação alérgica após tomar medicamentos para tratar inflamação ou dor. Úlceras gástricas no estômago ou intestino se tem sangramento ou perfuração no estômago ou no intestino, sintomas que podem resultar em sangue nas fezes ou fezes pretas, se você está nos últimos três meses de gravidez. Doença grave no fígado ou nos rins. Insuficiência cardíaca grave.

APRESENTAÇÃO:

Comprimido revestido – Caixa com 20 comprimidos

BETACORTAZOL

cetoconazol 20mg/g
+ dipropionato de betametasona 0,64mg/g
+ sulfato de neomicina 2,5mg/g

**ANTIMICÓTICO/ANTI-INFLAMATÓRIO/
ANTIBACTERIANO**

Registro M.S. 1.0571.0094

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA



INDICAÇÕES:

Tratamento de doenças de pele, onde se exigem ações anti-inflamatória, antibacteriana e antimicótica causadas por germes sensíveis como dermatite de contato, dermatite atópica, dermatite seborréica, intertrigo, desidrose, neurodermatite.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis aos componentes da fórmula. Não use o medicamento nos olhos ou ao redor deles. Não utilizar em determinadas infecções da pele, tais como: varicela, herpes simples ou herpes-zóster, tuberculose cutânea ou sífilis cutânea.

APRESENTAÇÃO:

Creme dermatológico – Bisnaga com 30g

CAPTOMIDO

captopril

ANTI-HIPERTENSIVO

Registro M.S. 1.0571.0115

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

INDICAÇÕES:

Tratamento de pacientes com hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva, infarto do miocárdio e nefropatia diabética.

CONTRAINDICAÇÕES:

Casos de reações alérgicas anteriores com o uso deste medicamento ou de qualquer outro medicamento que aja da mesma maneira que o captopril.

APRESENTAÇÕES:

Comprimido 25mg – Caixa com 30 comprimidos

Comprimido 50mg – Caixa com 30 comprimidos



COLPADAK

nitrate de miconazol 20mg/g

ANTIFÚNGICO

Registro M.S. 1.0571.0019

INDICAÇÕES:

Crema vaginal indicado no tratamento de infecções vulvovaginais e perianais produzidas por fungos.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não use Colpadak se você apresentar maior sensibilidade (alergia) ao nitrate de miconazol ou ao outros excipientes da formulação.

APRESENTAÇÃO:

Crema vaginal - Bisnaga com 80g + 14 aplicadores

DEXAGLÓS

dexametasona 0,1mg/mL

ANTI-INFLAMATÓRIO/ ANTIALÉRGICO

Registro M.S. 1.0571.0038

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

INDICAÇÕES:

Tratamento de sintomas de vários tipos de doenças, incluindo distúrbios reumáticos/artríticos, cutâneos, oculares, glandulares, pulmonares, sanguíneos e gastrintestinais.

CONTRAINDICAÇÕES:

Casos de infecções fúngicas sistêmicas, hipersensibilidade a sulfitos ou a qualquer componente do medicamento e administração de vacinas de vírus vivo.

APRESENTAÇÃO:

Elixir – Frasco com 100mL



FLAGIMAX

ANTIPARASITÁRIO

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

– SÓ PODE SER VENDIDO COM
RETENÇÃO DA RECEITA



FLAGIMAX GEL VAGINAL

metronidazol 100mg/g

Registro M.S. 1.0571.0103

INDICAÇÃO:

No tratamento de tricomoníase.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis a qualquer componente da fórmula ou a derivados imidazólicos.

APRESENTAÇÃO:

Gel vaginal – Bsnaga com 50g + 10 aplicadores

FLAGIMAX SUSPENSÃO

benzoilmetronidazol 40mg/mL

Registro M.S. 1.0571.0125

INDICAÇÕES:

Tratamento de giardíase e amebíase.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis a qualquer componente da fórmula ou a derivados imidazólicos. É contraindicado para menores de 1 ano de idade.

APRESENTAÇÃO:

Suspensão oral – Frasco com 100mL + copo dosador

FLUCOL

fluconazol 150mg

ANTIFÚNGICO

Registro M.S. 1.0571.0084

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

INDICAÇÕES:

Tratamento de candidíase vaginal de repetição ou recorrente, balanite por Cândida e dermatomicoses, como: Tinea pedis, Tinea corporis, Tinea cruris e Tinea unguium (onicomicoses – micose de unha)

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis ao fluconazol ou aos compostos azólicos ou a qualquer componente da fórmula. Não tomar Flucol com terfenadina, cisaprida, astemizol, eritromicina, pimozida e quinidina, porque pode ser perigoso e provocar alterações do ritmo do coração.

APRESENTAÇÕES:

Cápsula – Caixas com 1 e 2 cápsulas



2 CÁPSULAS



NEUTOSS

sulfato de salbutamol 0,48mg/mL

BRONCODILATADOR

Registro M.S. 1.0571.0026

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

INDICAÇÕES:

Controle e prevenção dos broncoespasmos. Como broncodilatador na asma brônquica, nas bronquites agudas e em alguns pacientes com doenças pulmonares obstrutivas crônicas.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes que fazem uso de betabloqueadores. Em caso de hipersensibilidade ao salbutamol.

APRESENTAÇÃO:

Xarope – Frasco com 100mL + copo dosador

OMOPREL

omeprazol

ANTIULCEROSO

Registro M.S. 1.0571.0083

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA



INDICAÇÕES:

Tratamento de úlceras pépticas benignas, tanto gástrica quanto duodenal.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis ao omeprazol ou aos outros componentes da fórmula. É contraindicado para menores de 1 ano de idade.

APRESENTAÇÕES:

Cápsula 20mg – Caixas com 14, 28 e 56 cápsulas
Cápsula 40mg – Caixas com 14, 28 e 56 cápsulas

PLABEL

cloridrato de metoclopramida

ANTIEMÉTICO

Registro M.S. 1.0571.0086

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA



INDICAÇÕES:

Este medicamento é destinado ao tratamento de alterações da movimentação do sistema digestivo como em enjoos e vômitos de origem cirúrgica, doenças metabólicas e infecciosas, secundárias a medicamentos. Plabel é utilizado também para facilitar os procedimentos radiológicos que utilizam o raio-x no trato gastrointestinal.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis aos componentes da fórmula, pacientes epiléticos ou que estejam recebendo outras drogas que possam causar reações extrapiramidais, pacientes com feocromocitoma, pois pode desencadear crise hipertensiva e nos casos em que a estimulação da motilidade gastrointestinal seja perigosa, como na presença de hemorragia, obstrução mecânica ou perfuração gastrointestinal. Em pacientes com histórico de discinesia tardia (movimentos repetitivos, involuntários e não-intencionais que às vezes continua ou aparece mesmo após o fármaco não ser mais utilizado por um longo tempo) induzida por neurolépticos (medicamentos usados no tratamento de psicoses).

APRESENTAÇÕES:

Comprimido 10mg – Caixa com 20 comprimidos

Solução oral 4mg/mL – Frasco gotejador com 10mL

QUADRIBETA

valerato de betametasona 0,5mg/g + sulfato de gentamicina 1,0mg/g
+ tolnaftato 10,0mg/g + clioquinol 10,0mg/g

ANTI-INFLAMATÓRIO/ANTIFÚNGICO/ANTIBACTERIANO

Registro M.S. 1.0571.0136

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE

SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA



INDICAÇÕES:

Para alívio das manifestações inflamatórias das dermatoses responsivas aos corticosteróides, quando complicadas por infecção secundária causada por microrganismos sensíveis aos componentes de sua formulação ou quando há suspeita da possibilidade de tal infecção.

CONTRAINDICAÇÃO:

Pacientes sensíveis a qualquer um dos componentes da fórmula. Este medicamento é contraindicado para menores de 3 anos.

APRESENTAÇÕES:

Creme dermatológico – Bisnaga com 20g

Pomada dermatológica – Bisnaga com 20g



TROMIZIR

azitromicina di-hidratada 500mg

ANTIBIÓTICO

Registro M.S. 1.0571.0122

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

– SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA

INDICAÇÕES:

Tromizir é indicado no tratamento de infecções causadas por bactérias sensíveis à azitromicina; em infecções do trato respiratório inferior (brônquios e pulmões) e superior (nariz, faringe, laringe e traqueia), incluindo sinusite (infecção nos seios da face), faringite (inflamação da faringe) ou amigdalite (inflamação das amígdalas); infecções da pele e tecidos moles (músculos, tendões, gordura); em otite média (infecção do ouvido médio) aguda e nas doenças sexualmente transmissíveis não complicadas nos genitais de homens e mulheres, causadas pelas bactérias *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria gonorrhoeae*. É também indicado no tratamento de cancro (lesão de pele) devido a *Haemophilus ducreyi* (espécie de bactéria). Infecções que ocorrem junto com sífilis (doença sexualmente transmissível) devem ser excluídas.

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis à azitromicina, à eritromicina, a qualquer antibiótico macrolídeo, ou cetolídeo, e a qualquer componente da fórmula.

APRESENTAÇÃO:

Comprimido revestido – Caixa com 3 comprimidos

UROTROBEL

norfloxacin 400mg

ANTIBIÓTICO

Registro M.S. 1.0571.0116

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

– SÓ PODE SER VENDIDO COM
RETENÇÃO DA RECEITA

INDICAÇÕES:

Inflamação do estômago e intestino (gastreenterite) causada por alguns tipos de bactérias; gonorréia; febre tifóide. Urotrobel pode também ser usado para prevenção de infecções nos seguintes casos: - contagem baixa de leucócitos (nestes casos, seu corpo fica mais sensível a infecções causadas por bactérias que fazem parte da flora intestinal); - quando você visitar locais em que possa ficar exposto a bactérias que possam causar inflamação do estômago e intestinos (gastreenterite).

CONTRAINDICAÇÕES:

Pacientes sensíveis ao norfloxacin ou a qualquer antibacteriano quinolônico quimicamente relacionado e a qualquer componente da fórmula. É contraindicado para menores de 12 anos.

APRESENTAÇÃO:

Comprimido revestido – Caixa com 14 comprimidos



RENOPRIL

maleato de enalapril

ANTI-HIPERTENSIVO

Registro M.S. 1.0571.0096

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA



INDICAÇÕES:

Controle da pressão arterial e auxiliar no tratamento da insuficiência cardíaca.

CONTRAINDICAÇÕES:

Em casos de sensibilidade a qualquer componente da fórmula e em casos em que o paciente já foi tratado com medicamentos do mesmo grupo do Renopril (inibidores da ECA), e apresentou reações alérgicas, tais como inchaço da face, dos lábios, da língua e/ou garganta que dificultaram sua respiração ou sua capacidade de engolir. O paciente não deve tomar Renopril se tiver apresentado algumas dessas reações alérgicas, sem causa conhecida, ou se tiver nascido com esse tipo de alergia. Se tiver diabetes e estiver tomando um medicamento chamado alisquireno para reduzir a pressão arterial.

APRESENTAÇÕES:

Comprimido 5mg – Caixa com 30 comprimidos

Comprimido 10mg – Caixa com 30 comprimidos

Comprimido 20mg – Caixa com 30 comprimidos



Rua Alair Marques Rodrigues, nº 516,
Bairro Santa Amélia
Pampulha • CEP 31560-220
Belo Horizonte - MG
(31) 2105-1100

www.belfar.com.br


ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 031 0055

CATÁLOGO DE PRODUTOS



ALTEFAR
GENÉRICOS

MEDICAMENTO GENÉRICO - LEI Nº 9.787/99





Somos uma empresa voltada para a produção de genéricos, que chega ao mercado comprometida com a segurança dos produtos. Para tanto, levamos muito a sério o processo de desenvolvimento dos nossos medicamentos. Reconhecemos a importância de investir em uma equipe de cientistas motivados e preparados para liderar pesquisas inovadoras na área, para assim, alcançarmos resultados transformadores.

Dedicamos nosso trabalho a oferecer as melhores soluções para os mais variados medicamentos encontrados no mercado, sempre com eficácia, qualidade e alta tecnologia, pois a Altefar não existiria sem um elemento essencial: **VOCÊ!**

Por isso, convidamos você a conhecer um pouco mais dessa empresa que tem como objetivo não apenas sua segurança, como também sua saúde.



benzoilmetronidazol 40mg/mL

ANTIPARASITÁRIO



INDICAÇÕES

Tratamento de giardíase e amebíase.



CONTRAINDICAÇÕES

Pacientes sensíveis a qualquer componente da fórmula ou a derivados imidazólicos. É contraindicado para menores de 1 ano de idade.



APRESENTAÇÕES

Suspensão oral 40 mg/mL

- Frasco com 100 mL + copo dosador – 1.0571.0154.001-8
- EH com 50 frascos com 100 mL + copo dosador – 1.0571.0154.002-6
- EH com 100 frascos com 100 mL + copo dosador – 1.0571.0154.003-4



CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS

Pode provocar escurecimento da urina devido aos metabólitos de metronidazol. Não deve ser ingerido bebidas alcoólicas ou medicamentos que contenham álcool em sua formulação durante no mínimo 1 dia após o tratamento com metronidazol, devido à possibilidade de efeito antabuse. Não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Pacientes com encefalopatia hepática devem ter cautela quanto ao uso do medicamento, pois o mesmo é metabolizado pelo fígado. O medicamento possui interações medicamentosas com dissulfiram, terapia com anticoagulante oral, lítio, ciclosporina, fenitoína ou fenobarbital, 5-fluorouracil, bussulfano.



POSOLOGIA

Agite o frasco antes de administrar. Deve ser administrado por via oral.

Giardíase: Crianças de 1 a 5 anos: 5 mL, 2 vezes ao dia durante 5 dias. Crianças de 5 a 10 anos: 5 mL, 3 vezes ao dia durante 5 dias.

Amebíase: Amebíase intestinal: 20 mg (0,5 mL)/kg, 4 vezes ao dia, durante 5 a 7 dias ou Amebíase hepática: 20 mg (0,5 mL)/kg, 4 vezes ao dia, durante 7 a 10 dias.

Cada mL de suspensão contém 40 mg de benzoilmetronidazol que correspondem a 25 mg de metronidazol.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

metronidazol 100mg/g

ANTIPARASITÁRIO



INDICAÇÕES

No tratamento de tricomoníase.



CONTRAINDICAÇÕES

Pacientes com alergia ao metronidazol ou a qualquer derivado imidazólico e aos demais componentes da fórmula.



APRESENTAÇÕES

Gel vaginal 100 mg/g

- Bisnaga com 50 g + 10 aplicadores – 1.0571.0140.001-1
- EH com 25 bisnagas com 50 g + 250 aplicadores – 1.0571.0140.002-1
- EH com 50 bisnagas com 50 g + 500 aplicadores – 1.0571.0140.003-8



CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS

Pode ocorrer escurecimento da urina devido aos metabólitos do metronidazol. Não deve ser ingerida bebidas alcoólicas ou medicamentos que contenham álcool em sua formulação durante no mínimo 1 dia após o tratamento com metronidazol, devido à possibilidade de efeito antabuse. Este medicamento não deve ser usado por mulheres grávidas sem orientação médica. O medicamento pode possuir interações medicamentosas com: dissulfiram, terapia com anticoagulante oral, lítio, ciclosporina, fenitoína ou fenobarbital, fluorouracila, bussulfano, informe ao seu médico caso use algum destes medicamentos.



POSOLOGIA

A bisnaga contém quantidade suficiente para 10 aplicações. O aplicador preenchido até a trava do êmbolo consome, por dose, a quantidade máxima de 5 g do produto. O conteúdo é calculado para 10 dias de tratamento contínuos ou a critérios médico. Fazer 1 aplicação de preferência à noite, ao deitar-se. Cada aplicação contém 500 mg de metronidazol.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA
MEDICAMENTO GENÉRICO LEI Nº 9.787/1999

diclofenaco sódico 50mg

ANTI-INFLAMATÓRIO



INDICAÇÕES

Tratamento de formas degenerativas e inflamatórias de reumatismo, reumatismo não-articular, crises agudas de gota, inflamações pós-traumáticas e pós-operatórias dolorosas. Auxiliar nos processos infecciosos de ouvido, nariz e garganta.



CONTRAINDICAÇÕES

Pacientes sensíveis ao diclofenaco sódico ou a qualquer componente da fórmula. Reação alérgica após tomar medicamentos para tratar inflamação ou dor. Úlceras gástricas no estômago ou intestino se tem sangramento ou perfuração no estômago ou no intestino, sintomas que podem resultar em sangue nas fezes ou fezes pretas, se você está nos últimos três meses de gravidez. Doença grave no fígado ou nos rins. Insuficiência cardíaca grave.



APRESENTAÇÕES

Comprimido revestido 50 mg

- Caixa com 20 comprimidos – 1.0571.0152.001-7
- EH com 500 comprimidos – 1.0571.0152.003-3
- EH com 1000 comprimidos – 1.0571.0152.004-1



CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS

Deve-se tomar a menor dose do medicamento que alivia a dor e/ou inchaço e durante o menor tempo possível, de modo a manter o menor risco possível de efeitos secundários cardiovasculares. O medicamento pode ter interações medicamentosas com outros anti-inflamatórios incluindo ácido acetilsalicílico, corticoides, antidiabéticos com exceção da insulina, anticoagulantes ou inibidores seletivos da recaptação de serotonina, metotrexato, ciclosporina, tacrolimo, trimetoprima, antibacterianos quinolônicos, voriconazol e fenitoína, portanto se estiver tomando algum desses medicamentos deve ser informado ao médico. Se a qualquer momento enquanto estiver fazendo uso do medicamento houver qualquer sinal ou sintoma de problemas com o coração ou vasos sanguíneos, como dor no peito, falta de ar, fraqueza, ou fala arrastada, informe ao médico imediatamente. Devido a sua dosagem, diclofenaco sódico não é indicado para pacientes abaixo de 18 anos de idade. Não deve ser tomado durante a gravidez, a não ser que seja absolutamente necessário.



POSOLOGIA

Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros com um copo de água ou outro líquido. Recomenda-se tomar os comprimidos antes das refeições com o estômago vazio. Adultos: a dose inicial diária é geralmente de 100 a 150 mg, ou seja, 2 ou 3 comprimidos por dia. Não deve ser tomado mais que 150 mg por dia.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

diclofenaco sódico 10mg/g

ANTI-INFLAMATÓRIO



INDICAÇÕES

Anti-inflamatório tópico para aliviar a dor e reduzir edema.



CONTRAINDICAÇÕES

Pacientes alérgicos ao diclofenaco, a qualquer componente da formulação, ao ácido acetilsalicílico e a outros anti-inflamatórios.



APRESENTAÇÕES

Gel dermatológico 10 mg/g

- Bisnaga com 60 g – 1.0571.0152.002-5
- EH com 50 bisnagas com 60 g – 1.0571.0152.005-1



ADVERTÊNCIAS

DICLOFENACO SÓDICO É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

maleato de enalapril

ANTI-HIPERTENSIVO



INDICAÇÕES

Controle da pressão arterial e auxiliar no tratamento da insuficiência cardíaca.



CONTRAINDICAÇÕES

Em casos de sensibilidade a qualquer componente da fórmula e em casos em que o paciente já foi tratado com medicamentos do mesmo grupo do maleato de enalapril (inibidores da ECA), e apresentou reações alérgicas, tais como inchaço da face, dos lábios, da língua e/ou garganta que dificultaram sua respiração ou sua capacidade de engolir. O paciente não deve tomar maleato de enalapril se tiver apresentado algumas dessas reações alérgicas, sem causa conhecida, ou se tiver nascido com esse tipo de alergia. Se tiver diabetes e estiver tomando um medicamento chamado alisquireno para reduzir a pressão arterial.



APRESENTAÇÕES

- Comprimido 5 mg – Caixa com 30 - 1.0571.0158.002-8
- Comprimido 10 mg – Caixa com 30 - 1.0571.0158.004-4
- Comprimido 20 mg – Caixa com 30 - 1.0571.0158.006-0



ADVERTÊNCIAS

MALEATO DE ENALAPRIL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA BULA.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

cetoconazol 20mg/g + dipropionato de betametasona 0,64mg/g + sulfato de neomicina 2,5mg/g

ANTIMICÓTICO/ANTI-INFLAMATÓRIO/ANTIBACTERIANO



INDICAÇÕES

Tratamento de doenças de pele, onde se exigem ações anti-inflamatória, antibacteriana e antimicótica causadas por germes sensíveis como dermatite de contato, dermatite atópica, dermatite seborreica, intertrigo, desidrose, neurodermatite.



CONTRAINDICAÇÕES

Pacientes sensíveis aos componentes da fórmula. Não use o medicamento nos olhos ou ao redor deles. Não utilizar em determinadas infecções da pele, tais como: varicela, herpes simples ou herpes-zóster, tuberculose cutânea ou sífilis cutânea.



APRESENTAÇÕES

Creme dermatológico

- Bisnaga com 30 g – 1.0571.0149.001-0
- EH com 50 bisnagas com 30 g – 1.0571.0149.002-9
- EH com 100 bisnagas com 30 g – 1.0571.0149.003-7



CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS

Durante o tratamento não devem ser usados cosméticos sobre a área da pele tratada. Se ocorrer irritação no local onde foi passado o medicamento, deve-se procurar orientação médica. Este medicamento não deve ser usado por mulheres grávidas sem orientação médica. Não deve ser usado durante amamentação, exceto sob a orientação médica. Podem surgir interações com alguns medicamentos, como por exemplo, medicamentos prejudiciais ao fígado: anticoagulantes como dicumarol; ciclosporina; famotidina; isoniazida; rifampicina; fenitoína; terfenadina; indinavir; saquinavir; ritonavir ou cisaprida. Evite tomar bebida alcoólica durante o tratamento.



POSOLOGIA

Aplique o medicamento somente na pele. O uso em outras áreas que não seja a pele, como por exemplo nos olhos, causará efeitos não desejados e, reações desagradáveis podem ocorrer. Use o medicamento no local. Aplique uma fina camada do creme sobre a área afetada da pele, 1 vez ao dia. Em casos mais graves ou conforme orientação do médico, pode ser aplicado 2 vezes ao dia. Não deve ser usado por períodos maiores que 2 semanas. Crianças menores de 12 anos devem usar pequenas quantidades do medicamento. Adultos e crianças não devem usar mais que 45 gramas por semana.

mebendazol

ANTIPARASITÁRIO



INDICAÇÕES

Tratamento das verminoses provocadas por infestações isoladas ou mistas.



CONTRAINDICAÇÕES

Pacientes sensíveis ao mebendazol ou qualquer componente da fórmula. Contraindicado para menores de 1 ano de idade.



APRESENTAÇÃO

• Comprimido 100 mg – Caixa com 6 – 1.0571.0159.001-5



ADVERTÊNCIAS

MEBENDAZOL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

mebendazol 20mg/mL

ANTIPARASITÁRIO



INDICAÇÕES

Tratamento das verminoses provocadas por infestações isoladas ou mistas.



CONTRAINDICAÇÕES

Pacientes sensíveis ao mebendazol ou qualquer componente da fórmula. Contraindicado para menores de 1 ano de idade.



APRESENTAÇÃO

Suspensão oral 20 mg/mL

• Frasco com 30 mL – 1.0571.0141.001-7



ADVERTÊNCIAS

MEBENDAZOL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

paracetamol

ANALGÉSICO/ANTITÉRMICO



INDICAÇÕES

Contra dor e febre.



CONTRAINDICAÇÕES

Pacientes sensíveis ao paracetamol ou a qualquer componente da fórmula. Paracetamol comprimido é contraindicado para menores de 12 anos.



APRESENTAÇÕES

Comprimidos 750 mg – Caixa com 20 – 1.0571.0161.007-5

Comprimidos 750 mg – Caixa com 200 – 1.0571.0161.001-6

Solução oral 200 mg/mL – Frasco gotejador com 15 mL – 1.0571.0161.003-2



ADVERTÊNCIAS

PARACETAMOL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

permetrina 1%

ANTIPARASITÁRIO



INDICAÇÕES

Mata piolhos e lêndeas e previne a reinfestação.



CONTRAINDICAÇÕES

Não usar em crianças abaixo de 2 anos de idade. Permetrina é contraindicado em pessoas que apresentam hipersensibilidade à permetrina bem como as piretrinas em geral. Não usar durante a gravidez nem a amamentação, a não ser com prescrição médica.



APRESENTAÇÃO

Loção – Frasco com 60 mL + Pente fino – 1.0571.0160.001-0



ADVERTÊNCIAS

PERMETRINA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

prometazina 20mg/g

ANTIALÉRGICO



INDICAÇÕES

Pruridos de várias etiologias, picadas de insetos e processos alérgicos tópicos.



CONTRAINDICAÇÕES

Dermatoses infectadas ou irritadas, eczema e lesões exsudativas. Em casos de sensibilidade à prometazina ou a qualquer componente da fórmula. É contraindicado para menores de 2 anos.



APRESENTAÇÃO

Creme dermatológico 20 mg/g
• Bisnaga com 30 g – 1.0571.0155.001-3



ADVERTÊNCIAS

PROMETAZINA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

nitrato de miconazol 20mg/g

ANTIFÚNGICO



INDICAÇÕES

Indicado para micoses superficiais por dermatófitos como pé de atleta, micoses superficiais saprofitárias, micoses superficiais por leveduras, candidíase cutânea generalizada e frieira.



CONTRAINDICAÇÕES

Não use este medicamento se você apresentar sensibilidade ao nitrato de miconazol ou aos outros componentes da formulação.



APRESENTAÇÕES

- Loção Dermatológico 20 mg/mL
- Frasco com 30 mL – 1.0571.0157.002-2
- Pó Dermatológico 20 mg/g
- Tubo com 30 g – 1.0571.0157.001-4



ADVERTÊNCIAS

NITRATO DE MICONAZOL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

nitrato de miconazol 20mg/g

ANTIFÚNGICO



INDICAÇÕES

Creme vaginal indicado no tratamento de infecções vulvovaginais e perianais produzidas por fungos.



CONTRAINDICAÇÕES

Não use este medicamento se você apresentar sensibilidade ao nitrato de miconazol ou aos outros componentes da formulação.



APRESENTAÇÃO

Creme vaginal 20 mg/g
• Bisnaga com 80 g + 14 aplicadores –
1.0571.0157.004-9



CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS

Durante as primeiras semanas de gravidez e durante a amamentação, o uso de qualquer medicação deve ser feito sob orientação médica. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Se estiver tomando um medicamento anticoagulante oral, como varfarina, consulte o médico antes de usar nitrato de miconazol. As ações e os efeitos colaterais de outros medicamentos podem ser aumentados, quando utilizados ao mesmo tempo com nitrato de miconazol.

POSOLOGIA

Não interrompa as aplicações durante o período menstrual. Deve ser utilizado um aplicador completamente preenchido com aproximadamente 5 g, inserido o mais profundamente na vagina, uma vez ao dia, durante 14 dias consecutivos. Não use mais de 5 g (1 aplicador preenchido) por dia.



VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
MEDICAMENTO GENÉRICO LEI Nº 9.787/1999



INDICAÇÕES

Indicado para micoses superficiais por dermatófitos como pé de atleta e micoses superficiais saprofitárias, micoses superficiais.



CONTRAINDICAÇÕES

Não use este medicamento se você apresentar sensibilidade ao nitrato de miconazol ou aos outros componentes da formulação.



APRESENTAÇÃO

Creme dermatológico 20 mg/g
• Bisnaga com 28 g – 1.0571.0157.003-0



CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS

NITRATO DE MICONAZOL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.

bacitracina 250ui/g + sulfato de neomicina 5mg/g

ANTIBIÓTICO TÓPICO



INDICAÇÕES

Tratamento de infecções da pele, ferimentos e queimaduras.



CONTRAINDICAÇÕES

Pacientes sensíveis à neomicina, aos antibióticos aminoglicosídeos e aos outros componentes da fórmula. Este medicamento é contraindicado para bebês prematuros, recém-nascidos e lactantes.



APRESENTAÇÕES

Pomada dermatológica

- Bisnaga com 10g – 1.0571.0163.002-5
- Bisnaga com 15g – 1.0571.0163.001-7
- EH com 50 bisnagas com 10g – 1.0571.0163.004-1
- EH com 50 bisnagas com 15g – 1.0571.0163.003-3



ADVERTÊNCIAS

SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA ZÍNCICA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Cloridrato de metoclopramida

ANTIEMETICO



INDICAÇÕES

Este medicamento é destinado ao tratamento de alterações da movimentação do sistema digestivo como em enjoos e vômitos de origem cirúrgica, doenças metabólicas e infecciosas, secundárias a medicamentos. CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA é utilizado também para facilitar os procedimentos radiológicos que utilizam o raio-x no trato gastrointestinal.



CONTRAINDICAÇÕES

Pacientes sensíveis aos componentes da fórmula, pacientes epilépticos ou que estejam recebendo outras drogas que possam causar reações extrapiramidais, pacientes com feocromocitoma, pois pode desencadear crise hipertensiva e nos casos que a estimulação da motilidade gastrointestinal seja perigosa, como na presença de hemorragia, obstrução mecânica ou perfuração gastrointestinal. Em pacientes com histórico de discinesia tardia (movimentos repetitivos, involuntários e não-intencionais que às vezes continua ou aparece mesmo após o fármaco não ser mais utilizado por um longo tempo) induzida por neurolépticos (medicamentos usados no tratamento de psicoses, como anestésicos e em outros distúrbios psíquicos).



APRESENTAÇÕES

Solução oral 4mg/mL

- Frasco com 10mL – 1.0571.0165.001-8
- EH com 25 frasco com 10mL – 1.0571.0165.003-4
- EH com 50 frasco com 10mL – 1.0571.0165.004-2

Comprimido 10 mg

- Comprimido 10 mg - caixa com 20 - 1.0571.0165.002-6
- Comprimido 10 mg - caixa com 500 - 1.0571.0165.005-0
- Comprimido 10 mg - caixa com 1000 - 1.0571.0165.006-9
- Comprimido 10 mg - caixa com 2000 - 1.0571.0165.007-7




CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS

CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA SAÚDE.





www.belfar.com.br

Registrado por: Belfar Ltda.
CNPJ: 18.324.343/0001-77
Rua Alair Marques Rodrigues, 516
Bairro Santa Amélia
Belo Horizonte – MG
CEP: 31.560-220
Indústria Brasileira