



# *Catálogo de Produtos*

*Versão 2020*

A close-up photograph showing several hands of different skin tones cupping a young child. The child is wearing a bright pink shirt and is positioned in the center, with their head and upper body visible. The hands are arranged in a protective, cradling manner, with fingers pointing outwards. The background is softly blurred, focusing attention on the hands and the child. The overall mood is one of care, protection, and community.

*Natulab*  
*juntos cuidamos melhor*

20 ANOS

---

*Natulab*

O QUE  
FIZEMOS EM 20

É INSPIRAÇÃO  
PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS



# Cuidar bem é uma atitude contagiante



Tão importante quanto se cuidar  
é cuidar de alguém e compartilhar  
esse gesto para que cada vez  
mais pessoas se inspirem.  
Uma corrente do bem começa  
assim. E com a sua participação  
tem tudo para ser grandiosa.

**#COMPARTILHE  
CUIDADOS**

**Natulab**  
*juntos cuidamos melhor*



# Índice

**06** Vitaminas e Suplementos

**17** Saúde Digestiva

**30** Saúde Feminina

**35** Dor e Febre

**38** Saúde Respiratória

**43** Saúde da Pele

**48** Sistema Nervoso





# Vitaminas e Suplementos





07

# AD-VITAM

acetato de retinol + colesterciferol

Indicação

Suplemento vitamínico e mineral indicado para dietas restritivas e inadequadas

Reg. MS: 1.3841.0065



## Apresentação

43890

50.000 UI/mL + 10.000 UI/mL | Frasco 20mL

Posologia: 0-6 anos (com peso mínimo de 6,25kg) = utilizar 1 gota/dia correspondente a 1.250 UI de acetato de retinol e 250 UI de colesterciferol. / 7-10 anos = administrar a quantidade conforme peso corporal: 6,25kg a 12,5 kg: utilizar 1 (uma) gota/dia, correspondente a 1.250 UI de acetato de retinol e 250 UI de colesterciferol / 12,5 kg a 18,75 kg: utilizar 2 (duas) gotas/dia, correspondente a 2.500 UI de acetato de retinol e 500 UI de colesterciferol / A partir de 18,75 kg: utilizar 3 (três) gotas/dia, correspondente a 3.750 UI de acetato de retinol e 750 UI de colesterciferol. ACIMA DE 10 ANOS E ADULTOS: utilizar 3 (três) gotas/dia, correspondente a 3.750 UI de acetato de retinol e 750 UI de colesterciferol

50

## Caixa Emb.

DESTAQUE

# ARTICUL C

Colágeno + vitamina C + vitamina D

Indicação

A vitamina D auxilia na formação de ossos e dentes e na absorção de cálcio e fósforo

A vitamina C auxilia na formação do colágeno

As vitaminas D e C auxiliam no funcionamento do sistema imune



## Apresentação

19089

Cartucho com 30 sachês de 11,3g cada

## Caixa Emb.

12

Posologia: Adultos (≥ 19 anos): Misturar 1 sachê (11,3 g) em 200 mL (1 copo) de água ou qualquer outro líquido quente ou frio, conforme a preferência. O produto não apresenta sabor ou odor. Recomenda-se o consumo de 1 sachê (11,3 g) ao dia.

# BÊVITER

cloridrato de tiamina

## Indicação

Trata casos de carência de vitamina B1



08



7 898153 113856 0

Reg. MS: 1.3841.0048

## Apresentação

23774

300mg | 30 comprimidos revestidos

Posologia: 1 a 2 comprimidos revestidos ao dia

Caixa Emb.

50



09

# CALCIOVITAL

Suplemento alimentar líquido à base de cálcio, vitaminas D e B12  
Suplemento alimentar líquido à base de cálcio, zinco e vitaminas C, D e B12  
Suplemento alimentar em comprimidos à base de vitamina D e cálcio

## Indicação

A vitamina D auxilia na absorção de cálcio e fósforo, na formação de ossos e dentes e na manutenção de níveis de cálcio no sangue.

O cálcio auxilia na formação e manutenção de ossos e dentes e no funcionamento neuromuscular.

A vitamina B12 auxilia na formação de células vermelhas do sangue, no metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras e no metabolismo da homocisteína.

A vitamina D, B12, C e zinco auxiliam no funcionamento do sistema imune e o cálcio e a vitamina D auxiliam no funcionamento muscular.



## Apresentação

208

D3 625mg | 60 comprimidos revestidos

Posologia: Adultos (≥ 19 anos), gestantes e lactantes: Consumir 1 a 2 comprimidos ao dia.

19794

D3 | Frasco 250mL sabor framboesa

Posologia: De 4 a 8 anos: Consumir 30 mL ao dia.  
De 9 a 18 anos e adultos (≥ 19 anos): Consumir 40 mL ao dia.

14033

Kids | Frasco 250mL sabor tutti-frutti

Posologia: De 4 a 8 anos: Consumir 5 mL ao dia.  
De 9 a 18 anos: Consumir 10 mL ao dia.

21835

B12 | Frasco 250mL

Posologia: De 4 a 18 anos: Consumir 30 mL ao dia.  
Adultos (≥ 19 anos): Consumir 60 mL ao dia.

## Caixa Emb.

50

36

24

36

DESTAQUE

# COMPLE B

tiamina + piridoxina + nicotinamina + riboflavina

## Indicação

Suplemento vitamínico

Auxilia em casos de deficiência de vitaminas do

Complexo B e em casos que apresentam probabilidade de desenvolver carência dessas vitaminas



Reg. MS: 1.3841.0051

## Apresentação

23780

50 comprimidos revestidos

Posologia: 1 comprimido revestido 1x ao dia

## Caixa Emb.

100



10

# DViter

DESTAQUE



Suplemento alimentar líquido à base de vitamina D  
Suplemento alimentar em comprimidos à base de vitamina D

## Indicação

A vitamina D auxilia na formação de ossos e dentes, na absorção de cálcio e fósforo, no funcionamento do sistema imune, no funcionamento muscular, na manutenção de níveis de cálcio no sangue e no processo de divisão celular.

## Apresentação

## Caixa Emb.

14275

200 UI | Frasco 20mL

200

Posologia: De 4 a 18 anos: Consumir 1 gota uma vez ao dia. Adultos ( $\geq 19$  anos), gestantes e lactantes: Consumir 1 gota uma vez ao dia.

21225

500 UI | Frasco 10mL

200

Posologia: De 4 a 18 anos, adultos ( $\geq 19$  anos), gestantes e lactantes: Consumir 1 gota uma vez ao dia.

22149

1000 UI | 30 comprimidos revestidos

50

Posologia: De 4 a 18 anos, adultos ( $\geq 19$  anos), gestantes e lactantes: Consumir 1 comprimido ao dia.

21226

2000 UI | 30 comprimidos revestidos

50

Posologia: De 9 a 18 anos, adultos ( $\geq 19$  anos), gestantes e lactantes: Consumir 1 comprimido ao dia.



Suplementos alimentares à base de vitamina D3 – Colecalciferol





11

# MASFEROL

sulfato ferroso

Indicação

Auxilia no tratamento de anemias  
carenciais



\* Reg. MS: 1.3841.0004

\*\* MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA  
RDC ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

## Apresentação

## Caixa Emb.

41484

25mg/mL | Frasco 100mL\*

50

Posologia: Crianças a partir de 12,56 Kg: 1 colher das de chá (5 mL), 1 vez ao dia. Adultos: 1 colher de chá (5mL), 2 vezes ao dia

38804

109mg | 40 comprimidos revestidos\*\*

200

Posologia: 1 comprimido revestido 1x ao dia em jejum

# NATUCLER

colina + vitaminas do Complexo B

## Indicação

A colina contribui para o metabolismo lipídico.

A biotina auxilia no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras, contribui para a manutenção do cabelo e da pele.

As vitaminas B6 e B12 auxiliam na formação de células vermelhas do sangue, no funcionamento do sistema imune e no metabolismo dos carboidratos, proteínas e gorduras

NOVA  
Embalagem



## Apresentação

## Caixa Emb.

20476

Caixa com 60 flaconetes de 10mL sabor abacaxi

24

Posologia: Adultos (≥ 19 anos): Ingerir 1 (um) flaconete de 10 mL ao dia.

# NUTRIFORT



12



7 899898 601337

*Suplemento vitamínico e mineral*

**Indicação**

*Complementa a alimentação*

*Contribui para a ingestão adequada de micronutrientes*

## Apresentação

## Caixa Emb.

19

Frasco 240mL sabor cereja

24

*Posologia: Crianças de 4 a 6 anos: Ingerir 15 mL.*

*Crianças de 7 a 10 anos: Ingerir 20 mL.*

*A partir de 11 anos e adultos: Ingerir 30 mL.*

# NUTRIVIT

*Suplemento vitamínico e mineral*

**Indicação**

*Complementa a alimentação*

*Contribui para a ingestão adequada de micronutrientes*



7 899898 601450



7 899898 601283

## Apresentação

## Caixa Emb.

20746

Frasco 240mL sabor cereja

24

*Posologia: Crianças de 4 a 6 anos: Ingerir 15 mL.*

*Crianças de 7 a 10 anos: Ingerir 20 mL.*

20504

Júnior Frasco 120mL sabor cereja

50

*Posologia: Crianças de 4 a 6 anos: Ingerir 15 mL.*

*Crianças de 7 a 10 anos: Ingerir 20 mL.*

*A partir de 11 anos e adultos: Ingerir 30 mL.*



13

# OSTEOFIX

carbonato de cálcio + vitamina D

## Indicação

Suplemento vitamínico mineral

Deve ser utilizado nos casos em que há dietas restritivas e inadequadas de cálcio e vitamina D, por pessoas que apresentam deficiência desses componentes no organismo

Reg. MS: 1.3841.0029

## Apresentação

24005

1250mg + 200UI | 60 comprimidos revestidos

Posologia: 2 a 3 comprimidos revestidos ao dia, durante as refeições ou conforme orientação médica

24010

1500mg + 200UI | 60 comprimidos revestidos

Posologia: 2 comprimidos revestidos ao dia, durante as refeições ou conforme orientação médica

## Caixa Emb.

50

50



# OSTEOFIX D3K2

Cálcio citrato malato + Magnésio +  
Vitamina K2 + Vitamina D3

## Indicação

A vitamina D auxilia na formação de ossos e dentes, auxilia na absorção de cálcio e fósforo, auxilia na manutenção de níveis de cálcio no sangue.

A vitamina K auxilia na manutenção dos ossos.

O cálcio auxilia na formação e manutenção de ossos e dentes.

O magnésio auxilia na formação de ossos e dentes.



Produto dispensado da obrigatoriedade de registro no M.S.  
de acordo com a RDC 27 de 06 de agosto de 2010

## Apresentação

19584

30 comprimidos revestidos

Posologia: 1 comprimido uma vez ao dia ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista. Preferencialmente, a ingestão do comprimido deve ser acompanhada de um copo de água.

## Caixa Emb.

24

# STARFOR C



14



aspartato de arginina + ácido ascórbico

## Indicação

Possui ação antioxidante

Auxilia o sistema imunológico e a recuperação durante o período pós-cirúrgico

Suplementa casos de carência de vitamina C

Reg. MS: 1.3841.0041

## Apresentação

24054

1g + 1g | 10 comprimidos efervescentes

Caixa Emb.

100

Posologia: 1 comprimido efervescente uma vez ao dia. (dose diária de 1 g de aspartato de arginina e 1 g de ácido ascórbico).

Não ultrapassar a dose recomendada (1 comprimido efervescente ao dia).

# VITAMIN E

acetato de racaifatoferol

## Indicação

Trata casos de carência de vitamina E

Possui ação antioxidante



Reg. MS: 1.3841.0035

## Apresentação

24068

400mg | 30 cápsulas

Caixa Emb.

50

Posologia: 1 cápsula ao dia



15

# vitaz

## Apresentação

## Caixa Emb.

|              |                                            |    |
|--------------|--------------------------------------------|----|
| <b>19969</b> | <b>A-Z   60 comprimidos revestidos*</b>    | 50 |
|              | Posologia: 1 comprimido ao dia             |    |
| <b>19972</b> | <b>Cabelo   60 cápsulas*</b>               | 50 |
|              | Posologia: 1 cápsula ao dia                |    |
| <b>19968</b> | <b>Mamãe   30 comprimidos revestidos*</b>  | 50 |
|              | Posologia: 1 comprimido ao dia             |    |
| <b>19970</b> | <b>Mulher   60 comprimidos revestidos*</b> | 50 |
|              | Posologia: 1 comprimido ao dia             |    |
| <b>19971</b> | <b>Sênior   60 comprimidos revestidos*</b> | 50 |
|              | Posologia: 1 comprimido ao dia             |    |
| <b>19973</b> | <b>Ômega 3   60 cápsulas**</b>             | 50 |
|              | Posologia: 1 a 2 cápsulas ao dia           |    |
| <b>19974</b> | <b>Ômega 3   120 cápsulas**</b>            | 50 |
|              | Posologia: 1 a 2 cápsulas ao dia           |    |

## Indicação

A linha de vitaminas vitaz foi desenvolvida para acompanhar a correria do dia a dia e complementar ou suplementar necessidades nutricionais de todas as fases da vida, contribuindo na melhoria do funcionamento do organismo e promovendo a qualidade de vida.

\* Produto dispensado da obrigatoriedade de registro no M.S. de acordo com a RDC 27 de 06 de agosto de 2010

\*\* Reg. MS: 6.6339.0011



O complemento  
que faltava.

Linha de vitaminas  
que suplementa  
as necessidades  
nutricionais.

DESTAQUE



# ViterC



16

ácido ascórbico | ácido ascórbico + zinco

## Indicação

Auxilia no sistema imunológico\*

Atua como antioxidante\*

Auxilia no período de recuperação após intervenção cirúrgica ou doenças debilitantes\*\*

A vitamina C auxilia no funcionamento do sistema imune e é um antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres\*\*\*

\* Reg. MS.: 1.3841.0018 / \*\* Reg. MS.: 1.3841.0060

## Apresentação

## Caixa Emb.

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 22393 | 200mg/mL   Frasco 20mL***                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 |
|       | Posologia: De 4 a 8 anos: Ingerir 3 gotas (0,30 mL) 1 vez ao dia, podendo utilizar 3 gotas (0,30 mL) até 4 vezes ao dia. De 9 a 18 anos, adultos (≥ 19 anos), gestantes e lactantes: Ingerir 20 gotas (1 mL) 1 vez ao dia, podendo utilizar 20 gotas (1 mL) até 4 vezes ao dia. |     |
| 24069 | 500mg   20 comprimidos*                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 |
|       | Posologia: 1 comprimido ao dia, preferencialmente pela manhã. Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros e sem mastigar, com quantidade suficiente de água para que sejam deglutidos                                                                                           |     |
| 24096 | 1g   10 comprimidos efervescentes*                                                                                                                                                                                                                                              | 100 |
|       | Posologia: 1 comprimido ao dia, dissolvido em água                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 24097 | 1g   30 comprimidos efervescentes*                                                                                                                                                                                                                                              | 50  |
|       | Posologia: 1 comprimido ao dia, dissolvido em água                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 24099 | 1g + 10mg   10 comprimidos efervescentes**                                                                                                                                                                                                                                      | 100 |
|       | Posologia: 1 comprimido ao dia, dissolvido em água                                                                                                                                                                                                                              |     |

Vitamina C de uso diário .  
Auxilia no sistema imunológico.

A VITAMINA C MAIS VENDIDA DO BRASIL \*

NOVA  
Embalagem



7 899898 601535



7 898133 1156481



7 899470 1800264



7 899470 1800325



7 899470 1800240

DESTAQUE





**Saúde  
Digestiva**



18

## Saccharomyces boulardii CNCM I-745 liofilizado

### Indicação

Floratil® está indicado como auxiliar no tratamento de diarreias de diferentes causas e na restauração da flora intestinal.

Floratil® AT está indicado na prevenção da diarreia causada por antibióticos e como auxiliar no tratamento da diarreia causada pelo micróbio *Clostridium difficile*, em decorrência do uso de antibióticos e quimioterápicos. Também é recomendado como auxiliar na restauração da flora intestinal.

### Floratil® 100 mg



7 899470 807409



Reg. MS: 1.3841.0071.017-1



### Floratil® 200 mg



7 899470 807416



Reg. MS: 1.3841.0071.014-5



7 899470 807423

Reg. MS: 1.3841.0071.002-1



7 899470 807430



Reg. MS: 1.3841.0071.001-3

\* Nicoli J.R. et al. Comparação de seis produtos probióticos contendo *Saccharomyces boulardii*. Revista Brasileira de Medicina 2005; 62 (4): 151-155 (5)

\*\* *Saccharomyces boulardii* CNCM I - 745 - Biocodex é o número um no mundo no mercado de medicamentos probióticos em valor. Cálculo interno via IOVIA: Midas dados de base Midas, ATC3:A7F escopo de mercado, Q1 2019.

# FLORATIL®

*Saccharomyces boulardii* CNCM I-745®



19

Merck Natulab

43233

## Apresentação

Caixa Emb.

Floratil® 100 mg | 12 cápsulas de gelatina

60

### Posologia:

Diarreia aguda e diarreia por *Clostridium difficile*:

4 cápsulas/dia (2X2) - 2 cápsulas, 2 vezes ao dia.

Nas alterações crônicas da flora intestinal:

2 cápsulas/dia (1X2) - 1 cápsula duas vezes ao dia.

43234

Floratil® 200 mg | 6 cápsulas de gelatina

120

42347

43235

Floratil® 200mg | 4 sachês com 1 g de pó oral

160

43236

Floratil® 200mg | 6 sachês com 1 g de pó oral

160

### Posologia:

Diarreia aguda e diarreia por *Clostridium difficile*:

2 cápsulas/dia - uma cápsula duas vezes ao dia.

2 envelopes/dia - um envelope, duas vezes ao dia.

Nas alterações crônicas da flora intestinal:

1 cápsula/dia - uma cápsula uma vez ao dia.

1 envelope/dia - um envelope, uma vez ao dia.

43231

Floratil® AT 250mg | 10 sachês com 1,25 g de pó oral

80

42349

43229

Floratil® AT 250mg | 10 cápsulas de gelatina

80

### Posologia:

Na prevenção da diarreia causada por antibióticos:

1 a 2 cápsulas, duas vezes ao dia (2 a 4 cápsulas/dia), ou 1 a 2 envelopes, 2 vezes ao dia, pelo tempo que durar o tratamento com antibióticos ou a critério médico.

Como adjuvante no tratamento da diarreia produzida por *Clostridium difficile*,

por antibioticoterapia ou quimioterapia e na restauração da flora intestinal

fisiológica:

1 a 2 cápsulas, uma a duas vezes ao dia (2 a 4 cápsulas/dia) ou 1 a 2 envelopes,

uma a duas vezes ao dia.

Atenção: as embalagens estão em processo de transição. Favor se atentar ao código de faturamento a ser utilizado (usar código Merck apenas se houver estoque remanescente). A mudança ocorrerá ao longo do ano até o final de 2020.

## Floratil® AT 250mg

“EXCLUSIVA APRESENTAÇÃO PARA DIARREIA ASSOCIADA AO USO DE ANTIBIÓTICOS.”



7 899470 807454




Reg. MS: 1.3841.0071.022-6



7 899470 807478

Reg. MS: 1.3841.0071.029-3





20

# AFTIV

Extrato fluído de Rosas rubras

## Indicação

Atua como adstringente nos casos de estomatites,  
principalmente infantil (sapinho)

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC  
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

## Apresentação

34232 100mg/mL | Frasco 25mL

Posologia: Direcionar o jato no local da lesão na boca ou garganta. Aplicar  
conforme necessidade

## Caixa Emb.

100



7 898133 113974 1

# ALCACHOFRA NATULAB

*Cynara scolymus L.*

## Indicação

Facilita a digestão

Alivia o desconforto abdominal, os gases e náuseas  
resultantes de deficiência na produção e eliminação da bile



7 899470 180141 4

Reg. MS: 1.3841.0056

## Apresentação

23719 300mg | 30 cápsulas

Posologia: : 2 cápsulas, 3 x ao dia

## Caixa Emb.

50



# ALUMIMAX

hidróxido de alumínio

**Indicação**

Antiácido

Atua como coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas, duodenais e esofagite de refluxo



**21**



MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC  
ANVISA Nº 199/2006. AFE Nº 1.03841-3

## Apresentação

## Caixa Emb.

**28582** 60mg/mL | Frasco 100mL

50

**28578** 60mg/mL | Frasco 150mL

60

Posologia: 5 a 10 mL 4x ao dia, 15 minutos antes das refeições e antes de deitar, ou a critério médico



# CARDOMARIN

*Silybum marianum* (L.) Gaertner

**Indicação**

Hepatoprotetor

AGORA É  
OTC

Reg. MS: 1.3841.0061

## Apresentação

## Caixa Emb.

**23815** 18,05mg/mL | Frasco 100mL com copo dosador

50

Posologia: 1 copo medida (10mL) 3x ao dia

**30895** 254mg | 20 cápsulas

100

Posologia: 2 cápsulas 1x ao dia

**30897** 127mg | 20 comprimidos revestidos

100

Posologia: 3 comprimidos 1x ao dia



7 899470 804149

7 899470 804200



22

# EPAPHYTO

*Peumus boldus* Molina

## Indicação

Auxilia em casos de espasmos intestinais, distúrbios digestivos leves e distúrbios hepatobiliares, com ação colagoga e colerética

Reg. MS: 1.3841.0055

## Apresentação

- 23783** 300mg | 30 cápsulas  
Posologia: 1 cápsula 3x ao dia
- 24129** 14mg/mL | Frasco 150mL  
Posologia: 10mL 4x ao dia

## Caixa Emb.

100  
60



# ESPINHEIRA SANTA NATULAB

*Maytenus ilicifolia*

## Indicação

Indicado para a má digestão

Atua como coadjuvante no tratamento de úlcera do estômago e duodeno

Reg. MS: 1.3841.0053

## Apresentação

- 23830** 380mg | 45 cápsulas  
Posologia: 3 cápsulas 3 x ao dia

## Caixa Emb.

50



# HELMILAB

mebendazol

## Indicação

Anti-helmíntico polivalente

Trata infestações isoladas ou mistas causadas por *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Enterobius vermicularis*, *Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*, *Taenia solium* e *Taenia saginata*



23



Reg. MS: 1.3841.0036

## Apresentação

23828 20mg/mL | Frasco 30mL com copo dosador

**Posologia:** Infestações por nematódeos: Use 5 mL do copo-medida 2 vezes ao dia durante 3 dias consecutivos, independente do peso corpóreo e idade. Infestações por cestódeos: Use 10 mL do copo-medida 2 vezes ao dia durante 3 dias consecutivos. A posologia para crianças é de 5 mL do copo-medida 2 vezes ao dia, durante 3 dias consecutivos

## Caixa Emb.

200



DESTAQUE

# Hidralyte

NOVA  
Embalagem

cloreto de sódio, citrato de sódio, citrato de potássio e glicose

## Indicação

Prevenção da desidratação e manutenção da hidratação após a fase de reidratação.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC  
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

## Apresentação

## Caixa Emb.

23833 Frasco 500mL sabor água de coco

24

23836 Frasco 500mL sabor guaraná

24

23839 Frasco 500mL sabor laranja

24

23843 Frasco 500mL sabor tutti-frutti

24

23846 Frasco 500mL sabor uva

24

## Posologia:

Adultos: administrar 750mL de solução por hora até o limite de 4L/dia.

Lactantes e crianças: administrar 20mL de solução/Kg por hora até o limite de 75 mL/Kg/dia.

Se nas duas primeiras horas de tratamento os vômitos continuarem impedindo que o paciente administre a solução, procurar imediatamente o médico.





24

# HIDRAPLEX

cloreto de sódio, cloreto de potássio,  
citrato de sódio e glicose

**Indicação**

Reidratante oral, previne a desidratação  
Mantém a hidratação em quadros de vômitos e diarreia agudos

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC  
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

## Apresentação

## Caixa Emb.

- |              |                                      |    |
|--------------|--------------------------------------|----|
| <b>23842</b> | 4 Sachês de 27,9g sabor água de coco | 30 |
| <b>23847</b> | 4 Sachês de 27,9g sabor guaraná      | 30 |
| <b>23850</b> | 4 Sachês de 27,9g sabor laranja      | 30 |
| <b>23855</b> | 4 Sachês de 27,9g sabor natural      | 30 |
| <b>23862</b> | 4 Sachês de 27,9g sabor tutti-frutti | 30 |
| <b>23867</b> | 4 Sachês de 27,9g sabor uva          | 30 |

**Posologia:** Dissolver o envelope em um litro de água filtrada ou fervida. Administrar 100 a 150 mL/kg de peso corporal em período de 4 a 6 horas. Se nas primeiras duas horas de tratamento os vômitos continuarem impedindo que o paciente administre a solução, procure imediatamente o médico



# KOLLANGEL

hidróxido de alumínio + hidróxido de magnésio

**Indicação**

Antiácido

Atua como coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e esofagites de refluxo. Alivia os sintomas da hiperacidez gástrica, azia, desconforto estomacal, dor de estômago e dificuldade de digestão

\* MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC  
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

\*\* Reg. MS: 1.3841.0062

## Apresentação

## Caixa Emb.

- |              |                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>28605</b> | Frasco 150mL sabor hortelã*                                                                                                                                                                | 60 |
|              | Posologia: 5 a 10 mL 4x ao dia, 15 minutos antes das refeições e antes de deitar, ou a critério médico                                                                                     |    |
| <b>28607</b> | Frasco 150mL sabor morango*                                                                                                                                                                | 60 |
|              | Posologia: 5 a 10 mL 4x ao dia, 15 minutos antes das refeições e antes de deitar, ou a critério médico                                                                                     |    |
| <b>28603</b> | Frasco 150mL sabor papaia*                                                                                                                                                                 | 60 |
|              | Posologia: 5 a 10 mL 4x ao dia, 15 minutos antes das refeições e antes de deitar, ou a critério médico                                                                                     |    |
| <b>27467</b> | FF Pó efervescente   50 envelopes sabor abacaxi**                                                                                                                                          | 24 |
|              | Posologia: Dissolver um sachê (5g) em 200mL de água, por até 4 vezes ao dia. Deve ser utilizado entre meia hora e uma hora antes das refeições e ao deitar, ou segundo recomendação médica |    |

# LACTPREV



25

## Lactase

Indicação

Auxilia a digestão da lactose presente nos alimentos lácteos



Reg. MS: 6.6339.0034

### Apresentação

### Caixa Emb.

20308

10.000 FCC ALU| 30 cápsulas

24

*Posologia: 1 cápsula para 2 ½ copos de leite (500 mL) ou 2 cápsulas para 5 copos de leite (1 L) ou consumo equivalente em outras preparações lácteas, instantes antes ou simultaneamente ao consumo de produtos lácteos*

# LACTULIFE

NOVA  
Embalagem

## Lactulose líquida

### Indicação

Fonte de fibras

As fibras alimentares auxiliam no funcionamento do intestino.



### Apresentação

### Caixa Emb.

13802

Frasco 120mL sabor ameixa

50

13806

Frasco 120mL sabor salada de frutas

50

*Posologia: De 4 a 18 anos, adultos (≥ 19 anos), gestantes e lactantes: Consumir 10 mL (1 colher de sopa) ao dia.*



26



# L-ENEMA

fosfato de sódio monobásico +  
fosfato de sódio dibásico

Indicação  
Laxante

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC  
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

## Apresentação

23876 0,16g/mL + 0,06g/mL | Frasco 130mL

## Caixa Emb.

50

Posologia: Administrar exclusivamente por via retal. Apresentação de dose única.

# LIMONADA PURGATIVA

sulfato de sódio

Indicação

Purgativo salino

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC  
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

## Apresentação

23879 175mg/mL | Frasco 200mL

## Caixa Emb.

60

Posologia: Ingerir, em jejum, pura ou diluída em água fervida ou filtrada em doses individuais de 100mL ou a critério médico





# LUFBEM



27

**NOVA  
APRESENTAÇÃO:**  
Cápsulas  
gelatinosas moles



*simeticona*

Indicação

Antigases

*Alivia o estufamento, desconforto abdominal e  
dores no abdômen causadas pelos gases*

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC  
ANVISA Nº 199/2006. AFE Nº 1.03841-3



**Alívio rápido  
dos sintomas  
causados pelos  
gases**

**Apresentação**

**Caixa Emb.**

**35686** 75mg/mL | Frasco 15mL sabor morango

100

*Posologia: Crianças com até 2 anos: tomar 5 gotas de 6 em 6 horas. Não ultrapassar a dose de 60 gotas/dia. Crianças de 2 a 12 anos: tomar 10 gotas de 6 em 6 horas. Não ultrapassar a dose de 60 gotas/dia. Adultos: tomar 10-30 gotas de 6 em 6 horas. Não ultrapassar a dose de 120 gotas/dias*

**44280** 125mg | Cartucho contendo 10 cápsulas gelatinosas

80

*Posologia: Adultos: ingerir 1 cápsula de 6 em 6 horas. Não ultrapassar a dose de 4 cápsulas/dia.*

# MAGMAX

*hidróxido de magnésio*

Indicação

Antiácido

Laxante suave

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC  
ANVISA Nº 199/2006. AFE Nº 1.03841-3

**Apresentação**

**Caixa Emb.**

**23883** 80mg/mL | Frasco 100mL sabor hortelã

100

**23881** 80mg/mL | Frasco 100mL sabor tradicional

100

*Posologia: Como laxante: 30 a 60mL (2 a 4 colheres de sopa). Como antiácido: 5 a 15mL (1 colher de chá a 1 colher de sopa), 2 a 3 x ao dia. Crianças: de um quarto a metade da dose para adultos, de acordo com a idade.*





28

# NATULAXE

Senna Alexandrina Mill.

**Indicação**

Laxante

Atua na prisão de ventre ocasional  
Auxilia casos em que a defecação fácil com fezes  
moles é desejável.

Auxilia no preparo de pacientes para exames  
laboratoriais no trato gastrointestinal



7 898153 115638 2

Reg. MS: 1.3841.0042

## Apresentação

23956 34mg | 20 cápsulas

**Posologia:** Ingerir 2 (duas) cápsulas ao dia, de preferência antes de dormir. Para pacientes idosos orienta-se utilizar, inicialmente, a metade da dose recomendada. Laxativos contendo Sene devem ser tomados por períodos curtos, no máximo 2 (duas) semanas. A utilização de laxantes por um período superior a 1 (uma) ou 2 (duas) semanas deverá ser realizada somente sob orientação médica

## Caixa Emb.

50

# NISTAMAX

nistatina

**Indicação**

Antifúngico

Trata a candidíase da cavidade bucal e do trato digestivo superior (esofagite por Candida) encontrada em casos que fazem uso prolongado de antibióticos, radioterapia ou drogas imunodepressoras que provocaram queda de resistência orgânica e na Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS)



7 89947 018069 7

Reg. MS: 1.3841.0028

## Apresentação

40888 100.000 UI/mL | Frasco 50mL c/ copo dosador

**Posologia:** Prematuros e crianças de baixo peso: estudos clínicos limitados demonstram que a dose de 1mL (100.000UI de nistatina) quatro vezes ao dia é efetiva. Lactentes: a dose recomendada é de 1 ou 2mL (100.000 a 200.000UI de nistatina) quatro vezes ao dia. Crianças e Adultos: A faixa de dose usual varia de 1 a 6mL (100.000 a 600.000 UI de nistatina) quatro vezes ao dia

## Caixa Emb.

50

# ÓLEO MINERAL

petrolato líquido

Indicação

Óleo mineral

Atua como laxante

Trata a pele ressecada

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC  
ANVISA Nº 199/2006. AFE Nº 1.03841-3

## Apresentação

23873 Frasco 100mL

**Posologia:** No tratamento da prisão de ventre, 15mL (1 colher de sopa) à noite e outra dosagem no dia seguinte ao despertar. Caso não obtenha êxito, aumente a dosagem para 30mL (2 colheres de sopa) à noite e 15mL pela manhã. Crianças maiores de 6 anos: (1-2mL) por kg de peso a noite ou pela manhã. Administração a crianças menores de 6 anos, consulte o seu médico

## Caixa Emb.

50

NOVA  
Embalagem



29

# PLANTOLAXY

*Plantago ovata*

Indicação

Restaura e mantém a regularidade do intestino

Promove o ajuste da consistência das fezes



Reg. MS: 1.3841.0059

## Apresentação

24038 3,4g | Caixa com 10 envelopes de 5g cada

## Caixa Emb.

50

**Posologia:** Adultos: dissolver o conteúdo de 1 envelope (5 g) em 240mL de água fria e tomar de 1 a 3 vezes ao dia. Crianças de 6-12 anos: ingerir metade da dose indicada para adultos, ou seja, dissolver o conteúdo equivalente a meio envelope (2,5 g) em 120 mL de água fria e tomar de 1 a 3 vezes ao dia. Um copo de água fria adicional é recomendado depois da ingestão, fornecendo um melhor efeito do medicamento. Administrar, preferencialmente, durante as refeições, não devendo ser tomado imediatamente antes de dormir





**Saúde  
Feminina**



31

# Afolic

ácido fólico

## Indicação

Suplementa casos de deficiência de ácido fólico e casos com risco de desenvolver carência desta vitamina. Indicado para mulheres que desejam engravidar, para prevenir o nascimento de pediátricos com defeitos na formação do tubo neural.



Reg. MS: 1.3841.0050

## Apresentação

23646

5mg | 20 comprimidos revestidos

Posologia: 1 comprimido a cada 24 horas

## Caixa Emb.

200

DESTAQUE

# BUSCOPLEX COMPOSTO

butilbrometo de escopolamina + dipirona

## Indicação

Alivia de maneira rápida e por longo tempo as cólicas, dores e desconforto abdominal.



Reg. MS: 1.3841.0066

## Apresentação

28440

6,67mg/mL + 333,4mg/mL | Frasco 20mL

Posologia: Adultos: 20 a 40 gotas, 3 a 4 vezes ao dia  
Crianças acima de 6 anos: 10 a 20 gotas, 3 a 4 vezes ao dia  
Crianças de 1 a 6 anos: 5 a 10 gotas, 3 a 4 vezes ao dia

## Caixa Emb.

200



# MATHERILLY GEST MATHERILLY LACT



NOVA  
Embalagem



Suplemento alimentar de vitaminas e  
minerais em comprimidos

## Indicação

Fórmulas desenvolvidas especialmente para os períodos da  
gestação e lactação

Fonte de ácido fólico que auxilia na formação do tubo neural do  
feto durante a gravidez\*

As vitaminas A, B6, B12, C e D, o ferro, o zinco, o selênio, o cobre  
e o ácido fólico auxiliam no funcionamento do sistema imune

## Apresentação

17491

Gest 1000mg | 30 comprimidos revestidos\*

Posologia: Gestantes: Ingerir 1 comprimido ao dia

17492

Lact 772mg | 30 comprimidos revestidos

Posologia: Lactantes: Ingerir 1 comprimido ao dia

## Caixa Emb.

50

50

# PAUSEFEMME

Extrato seco de Glycine Max (L.) Merr

## Indicação

Auxilia no alívio dos sintomas da menopausa

Reg. MS: 1.3841.0070



## Apresentação

36393

150mg | 30 comprimidos revestidos

Posologia: 1 comprimido revestido por dia. A dose pode ser aumentada,  
a critério médico, para dois comprimidos revestidos ao dia, divididos em  
duas doses

## Caixa Emb.

50



33

# PREVURI C

Cranberry + vitamina C

**Indicação**

*Auxilia na prevenção de infecções do trato urinário*

*Rico em vitamina C*

*A vitamina C é um antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres*



## Apresentação

19090

Cartucho com 30 sachês de 5g cada

*Posologia: Adultos (≥ 19 anos): Misturar 1 sachê (5 g) em 200 mL (1 copo) de água.  
Recomenda-se o consumo de 1 sachê (5 g) ao dia.*

## Caixa Emb.

24

# Varivax

CASTANHA DA ÍNDIA



34

*Aesculus hippocastanum L.*

## Indicação

Trata os sintomas da insuficiência venosa, como sensação de dor e peso nas pernas, inchaço, câimbras, prurido e fragilidade capilar

Reg. MS: 1.3841.0043

### Apresentação

### Caixa Emb.

|       |                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24061 | 100mg   30 comprimidos revestidos<br>Posologia: 1 comprimido revestido, três vezes ao dia |
| 24065 | 300mg   30 comprimidos revestidos<br>Posologia: 1 comprimido revestido, uma vez ao dia    |

50

50




**PERNAS,**  
PRA QUE TE QUERO?

PARA NÃO SENTIR O PESO DAS VARIZES.

DESTAQUE





## Dor e Febre



36

# ARPYNFLAN

*Harpagophytum procumbens*

**Indicação**

Trata quadros reumáticos acompanhados de dor,  
como artrite, artrose e lombalgia (dor nas costas)

Reg. MS: 1.3841.0057

## Apresentação

23670

450mg | 30 comprimidos revestidos

Posologia: 1 (um) comprimido revestido, 3 (três) vezes dia

## Caixa Emb.

100



# IBUPROTRAT

*ibuprofeno*

**Indicação**

Anti-inflamatório

Reduz a febre

Alivia dores decorrentes de gripes e resfriados, de garganta, cabeça,  
dente, nas costas, cólicas menstruais e dores musculares

Reg. MS: 1.3841.0033

## Apresentação

23851

50mg/mL | Frasco 30mL sabor framboesa

100

Posologia: Crianças: a dose recomendada para crianças a partir de 6 meses de idade pode variar de 1 a 2 gotas/Kg de peso, em intervalos de 8 a 6 horas, ou seja, de 3 a 4 vezes ao dia. A dose máxima por dose em crianças menores de 12 anos de idade é de 40 gotas (200mg) e a dose máxima permitida por dia é de 160 gotas (800mg). Adultos: a dose habitual do IBUPROTRAT, para febre é de 40 gotas (200mg) a 160 gotas (800mg), podendo ser repetida por, no máximo, 4 vezes por dia. A dose máxima permitida por dia em adultos é de 640 gotas (3200mg)

23857

20mg/mL | Frasco 100mL sabor laranja

50

Posologia: A dose recomendada é de 60 a 90 mL por dia (1200 a 1800 mg/dia) em doses divididas. Alguns pacientes podem ser mantidos com 30 a 60 mL por dia (600 a 1.200 mg/dia). Em casos graves e agudos, pode ser vantajoso aumentar a dose até a fase aguda terminar. A dose diária não deve exceder 120 mL por dia (2400 mg/dia), em doses divididas.

Uso pediátrico: a correlação entre a idade e peso é aproximada. Quando não houver correspondência entre o peso e a idade, considere o peso para estabelecer a dose. Nos quadros febris, a dose usual recomendada para crianças a partir dos 6 meses de idade é de 5 a 10 mg/kg de peso corpóreo, a cada 6 a 8 horas. A duração do tratamento varia conforme a indicação do medicamento







# MAXALGINA

dipirona monoidratada

**Indicação**

Analgésico e antipirético

Trata a dor e a febre



37

Reg. MS: 1.3841.0002



## Apresentação

## Caixa Emb.

23892 500mg/mL | Frasco 10mL

240

23906 500mg/mL | Frasco 20mL

200

*Posologia: Adultos e adolescentes acima de 15 anos: 20 a 40 gotas em administração única ou até o máximo de 40 gotas, 4 vezes ao dia. As crianças devem receber conforme seu peso seguindo a orientação da tabela apresentada na bula*

34071 500mg | 30 comprimidos

100

34072 500mg | 100 comprimidos

24

*Posologia: Adultos e adolescentes acima de 15 anos: 1 a 2 comprimidos até 4 vezes ao dia*

23912 50mg/mL | Frasco 100mL com copo dosador

50

23916 50mg/mL | Frasco 100mL com seringa dosadora

50

*Posologia: Adultos e adolescentes acima de 15 anos: 10 a 20 mL em administração única ou até o máximo de 20 mL, 4 vezes ao dia. As crianças devem receber conforme seu peso seguindo a orientação da tabela apresentada na bula*

# TYLEMEX

paracetamol

**Indicação**

Analgésico e Antipirético

Trata a dor e a febre

Reg. MS: 1.3841.0003

## Apresentação

## Caixa Emb.

24016 200mg/mL | Frasco 15mL

200

*Posologia: Crianças abaixo de 12 anos: 1 gota/kg até a dosagem máxima de 35 gotas. A dose recomendada de paracetamol varia de 10 a 15 mg/kg/dose, com intervalos de 4 a 6 horas entre cada administração. Não exceda 5 administrações (aproximadamente 50-75 mg/kg), em um período de 24 horas. Para crianças abaixo de 11 kg ou 2 anos, consultar o médico antes do uso. Adultos e crianças acima de 12 anos: 35 a 55 gotas, 3 a 5 vezes ao dia. A dose diária máxima de paracetamol é de 4000 mg (275 gotas) administrados em doses fracionadas, não excedendo a dose de 1000 mg/dose (55 gotas) com intervalos de 4 a 6 horas, no período de 24 horas*

23996 100mg/mL | Frasco 15mL com seringa

100

*Posologia: Administrar a dose do medicamento de acordo com o peso da criança e o volume (mL) correspondente indicado na seringa dosadora. (conforme tabela apresentada na bula)*

24009 160mg/5mL | Frasco 60mL com copo dosador

100

*Posologia: Administrar a dose do medicamento de acordo com o peso da criança e o volume (mL) correspondente indicado no copo de medida. (conforme tabela apresentada na bula)*







# Saúde Respiratória



39

# ARLIVRY

*Hedera helix L.*

## Indicação

Expectorante no tratamento da tosse produtiva, ou seja, quando esta vier acompanhada de catarro nas vias respiratórias.

Reg. MS: 1.3841.0047

## Apresentação

23792 7mg/mL | Frasco 100mL com copo dosador sabor cereja

50

23794 7mg/mL | Frasco 100mL com copo dosador sabor mel

50

Posologia: Adultos: tomar 4 mL, 3 vezes ao dia. Crianças de 6 - 12 anos: tomar 4 mL, 2 vezes ao dia. Crianças de 2 - 5 anos: tomar 2 mL, 2 vezes ao dia



# BRONQTRAT

*cloridrato de ambroxol*

## Indicação

Trata doenças broncopulmonares (brônquios e pulmões) agudas e crônicas para facilitar a expectoração (soltar o catarro do peito) quando houver acúmulo de secreção

Reg. MS: 1.3841.0023



## Apresentação

23805 15mg/5mL | Frasco 100mL com copo sabor framboesa

50

Posologia: Crianças de 2 a 5 anos: 2,5 mL - 3 vezes ao dia. Crianças de 6 a 12 anos: 5 mL - 3 vezes ao dia. A dose pode ser calculada à razão de 0,5 mg de ambroxol por quilograma de peso corpóreo, 3 vezes ao dia

30023 30mg/5mL | Frasco 100mL com copo sabor limão mentolado

50

Posologia: Adultos e adolescentes maiores de 12 anos: 5 mL por via oral, 3 vezes ao dia

# BUTALAB

sulfato de salbutamol

Indicação

Broncodilatador

Alivia o espasmo brônquico associado às crises de asma, bronquite crônica e enfisema



40



718994701809849

Reg. MS: 1.3841.0019

## Apresentação

33549

2,0mg/5mL | Frasco 100mL com copo dosador sabor framboesa

**Posologia:** Adultos: a dose usualmente eficaz é de 4 mg de salbutamol (10 mL do xarope) 3 ou 4 vezes ao dia. Caso não se obtenha a broncodilatação adequada, cada dose pode ser gradualmente aumentada para até 8 mg (20 mL do xarope). Contudo, observou-se que alguns pacientes obtêm alívio adequado com 2 mg (5 mL do xarope) 3 ou 4 vezes ao dia. Para os pacientes muito sensíveis a estimulantes beta-adrenérgicos, recomenda-se iniciar o tratamento com 2 mg (5 mL do xarope) 3 ou 4 vezes ao dia. Crianças: de 2 a 6 anos: 2,5 a 5 mL do xarope (1 a 2 mg de salbutamol) 3 ou 4 vezes ao dia. Crianças de 6 a 12 anos: 5 mL do xarope (2 mg de salbutamol) 3 ou 4 vezes ao dia. Crianças acima de 12 anos: 5 a 10 mL do xarope (2 a 4 mg de salbutamol) 3 ou 4 vezes ao dia. Pacientes idosos: recomenda-se iniciar o tratamento com 5 mL de xarope (2 mg de salbutamol) 3 ou 4 vezes ao dia

Caixa Emb.

50

# EXPECTOFUI

guaifenesina

Indicação

Expectorante

Fluidificante

Reg. MS: 1.3841.0021

## Apresentação

23825

13,33mg/mL | Frasco 120mL sabor cereja

**Posologia:** Adultos e crianças maiores de 12 anos: Tomar 15 mL a cada 4 horas. Crianças de 6 a 12 anos: Tomar 10 mL a cada 4 horas. Crianças de 2 a 6 anos: Tomar 5 mL a cada 4 horas. Não exceder 6 doses por dia

Caixa Emb.

30



718981331131110



41

# Nasojet

cloreto de sódio

Indicação

Fluidificante

Descongestionante nasal

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC  
ANVISA Nº 199/2006. AFE Nº 1.03841-3

Reg. M.S.: 1.3841.0072 \*\*

## Apresentação

## Caixa Emb.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| 40757                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30mg/mL   Frasco 50 mL**                | 50 |
| <i>Posologia: ADULTOS: Nasojet 3H: recomenda-se de 1 a 2 aplicações em cada cavidade nasal, 3 a 5 vezes ao dia, ou segundo critério médico, até o desaparecimento dos sintomas.</i>                                                                                                     |                                         |    |
| <i>CRIANÇAS (5 a 16 ANOS): Nasojet 3H: recomenda-se de 1 a 2 aplicações em cada cavidade nasal, 3 vezes ao dia, ou segundo critério médico, até o desaparecimento dos sintomas. Indicado toda vez que se requer higienização das fossas nasais por remoção e fluidificação do muco.</i> |                                         |    |
| 23961                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9mg/mL   Frasco 50mL                    | 50 |
| 26882                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aerossol 0,9%   Frasco 100mL            | 50 |
| 28092                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aerossol jato forte 0,9%   Frasco 100mL | 50 |
| <i>Posologia: Aplicar a solução nas narinas conforme necessidade</i>                                                                                                                                                                                                                    |                                         |    |

## A família cresceu e está ainda melhor

Nasojet 3H

Lançamento

NOVA  
Embalagem

**3x**  
MAIS CONCENTRADO\*  
CONTRA A CONGESTÃO  
NASAL



\*Nasojet 3H é uma solução hipertônica com 3% de cloreto de sódio, mais concentrada quando comparada às soluções isotônicas 0,9% que além de umidificar, descongestionam e fluidificam as secreções nasais.

DESTAQUE



# POLARADEx



42

maleato de dexclorfeniramina

**Indicação**

**Antialérgico**

Trata a *alergia, urticária, prurido, rinite alérgica, picada de inseto, conjuntivite alérgica, dermatite atópica e eczemas alérgicos*



Reg. MS: 1.3841.0020

## Apresentação

Caixa Emb.

**23974** 0,4mg/mL | Frasco 100mL sabor framboesa

50

**Posologia:** Adultos e crianças maiores de 12 anos: 5mL 3 a 4 vezes por dia. Não ultrapassar a dose máxima de 12mg/dia (ou seja, 30mL/dia). Crianças de 6 a 12 anos: 2,5mL três vezes por dia. Um máximo de 6mg diários (ou seja, 15mL/dia). Crianças de 2 a 6 anos: 1,25mL três vezes por dia. Um máximo de 3mg diários (ou seja, 7,5mL/dia)

# XAROPE DE GUACO NATULAB

*Mikania glomerata S.*

**Indicação**

**Expectorante**

**Broncodilatador**

Trata doenças do trato respiratório

Promove o relaxamento da musculatura lisa dos brônquios

Auxilia na eliminação das secreções brônquicas e no combate à tosse

Reg. MS: 1.3841.0032



## Apresentação

Caixa Emb.

**28916** 35mg/mL | Frasco com 100mL

50

**Posologia:** Adultos: 1 colher de sopa (15 ml - equivalente a uma dose de 0,39375 mg de cumarina) 3 (três) vezes ao dia. Crianças maiores de 2 anos: 1 colher de sopa (15 ml - equivalente a uma dose de 0,39375 mg de cumarina) 2 (duas) vezes ao dia

**24104** 117,6 mg/mL | Frasco 150mL

50

**Posologia:** Adultos: 1 colher de sopa (15 ml - equivalente a uma dose de 1,323 mg de cumarina) 3 (três) vezes ao dia. Crianças maiores de 5 anos: A posologia sugerida é ingerir 1/3 da dose (7 mL - equivalente a uma dose de 0,617 mg de cumarina)- 3 vezes ao dia. Crianças de 2 a 5 anos: A posologia sugerida é ingerir 1/3 da dose (5 ml - equivalente a uma dose de 0,441 mg de cumarina) 3 (três) vezes ao dia





# Saúde da Pele

Saúde da Pele



44

# BABY D

Vitaminas A e D + Óxido de Zinco

**Indicação**

Previne e trata assaduras e brotoejas

Pomada secativa e cicatrizante

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC  
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

**Apresentação**

27414

Bisnaga 45g

Posologia: Aplicar nas áreas afetadas, após limpeza, quando necessário

**Caixa Emb.**

100



7 89947 018057 26

NOVA  
Embalagem



7 898133 113475 31

# KALONAT

ácido salicílico + ácido láctico + colódio elástico

**Indicação**

Trata verrugas comuns, plantar e calosidades

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC  
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

**Apresentação**

23868

Frasco 10mL

Posologia: Aplicar uma vez ao dia, até eliminação da verruga ou calosidade, quatro camadas de colódio, esperando cada camada secar antes da reaplicação

**Caixa Emb.**

100

Com aplicador  
de alta precisão

# METIOTRAT

digliconato de clorexidina

**Indicação**

Antisséptico de uso geral para curativos



45



7 698133 137419



7 698133 137426

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC  
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

## Apresentação

- |       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 23918 | 10mg/mL   Frasco 30mL       |
| 23920 | 10mg/mL   Spray frasco 45mL |

## Caixa Emb.

200  
50

Posologia: Aplicar o produto de 3 a 4 vezes por dia

# PASTA D'ÁGUA

óxido de zinco + enxofre | óxido de zinco + mentol | óxido de zinco

**Indicação**

Na versão com mentol, oferece refrescância.

Na versão com enxofre, trata a escabiose

Atua como antisséptico, secativo e cicatrizante.



7 699470 805917



7 699470 805900

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC  
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

## Apresentação

- |       |                              |
|-------|------------------------------|
| 27460 | Óxido de zinco + enxofre 80g |
| 27461 | Óxido de zinco + mentol 80g  |
| 27416 | Óxido de zinco 80g           |

## Caixa Emb.

100  
100  
100

Posologia: Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia, exceto em zonas pilosas, como por exemplo bordas do couro cabeludo na nuca, zona peluda do púbis



7 699470 805740



46

# PVPI

*Iodopovidona*

**Indicação**

*Antisséptico para uso tópico*

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC  
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3

**Apresentação**

23982

Spray 100mL

*Posologia: Aplicar topicamente, nas áreas afetadas ou a critério médico*

**Caixa Emb.**

50



# RIFOTRAT

*Rifamicina sódica*

**Indicação**

*Antibiótico*

*Trata infecções de superfície causadas por micro-organismos sensíveis à rifamicina*



Reg. MS: 1.3841.0022

**Apresentação**

34671

10mg/mL | Frasco 20mL

*Posologia: Pulverizar a área afetada a cada 6-8 horas, ou a critério médico*

**Caixa Emb.**

50

**Produto  
intercambiável ao  
seu medicamento  
similar!**



# UNHAGOLD

ácido salicílico + associações

Indicação

Antimicótico tópico

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC  
ANVISA N° 199/2006. AFE N° 1.03841-3



Apresentação

Caixa Emb.

24020

Frasco 30mL

100

Posologia: Aplicar nas áreas afetadas, duas a três vezes ao dia




47





# Sistema Nervoso



**NÃO SE  
IRRITE,  
SEAKALM.**

*Passiflora incarnata* L.  
Indicação

*Trata casos de ansiedade leve, estados de irritabilidade, agitação nervosa, insônia e desordens da ansiedade*

Reg. MS: 1.3841.0039

## Apresentação

24694

260mg | 20 comprimidos revestidos

**Posologia:** 2 comprimidos revestidos 2x ao dia

50

23994

90mg/mL | Frasco 100mL

**Posologia:** 5mL da solução oral 4x ao dia

50

\* Produto Tradicional Fitoterápico de acordo com a RDC 26/2014

DESTAQUE

# VALESSONE

*Valeriana officinalis L.*

**Indicação**

*Sedativo moderado*

*Promove o sono*

*Trata distúrbios do sono associados à ansiedade*



**50**



7 898133 113724 2

Reg. MS: 1.3841.0046

**Apresentação**

**Caixa Emb.**

**24058**

225,75mg | 20 comprimidos revestidos

Posologia: 1 comprimido revestido 2x ao dia

50

## MINIBULAS DOS MEDICAMENTOS TARJADOS

**ARLIVRY** *Hedera helix* L. 7mg/mL. **INDICAÇÕES:** É indicado como expectorante no tratamento da tosse produtiva, ou seja, quando esta vier acompanhada de catarro nas vias respiratórias. **CONTRAINDICAÇÕES:** é contraindicado a pessoas que apresentem hipersensibilidade aos constituintes da formulação ou a plantas da família Araliaceae. Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos em virtude do risco de agravamento dos sintomas respiratórios. Não foi estabelecida a segurança durante a gravidez e o aleitamento. Tendo em vista os dados pré-clínicos de segurança, não se recomenda a utilização durante a gravidez e a lactação. **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** Tosse persistente ou recorrente em crianças entre 2-4 anos de idade requer diagnóstico médico antes tratamento. Quando dispnéia, febre ou expectoração purulenta ocorrer, um médico ou um farmacêutico deve ser consultado. O uso concomitante com antitussígenos com codeína ou dextrometorfano não é recomendado sem orientação médica. Recomenda-se precaução em pacientes com gastrite ou úlcera gástrica. **REAÇÕES ADVERSAS:** Reações gastrointestinais (náuseas, vômitos e diarreia) e reações alérgicas (urticária, erupção cutânea e dispneia). A frequência dessas reações não é conhecida. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** O uso concomitante com antitussígenos com codeína ou dextrometorfano não é recomendado sem orientação médica. **POSOLOGIA:** USO ORAL. Adultos: tomar 4 mL, 3 vezes ao dia. Crianças de 6 – 12 anos: tomar 4 mL, 2 vezes ao dia. Crianças de 2 – 5 anos: tomar 2 mL, 2 vezes ao dia. **APRESENTAÇÕES:** Frasco contendo 100mL (Xarope de Cereja c/ copo dosador), Frasco contendo 100mL (Xarope de Cereja c/ seringa dosadora), Frasco contendo 100mL (Xarope de Mel c/ copo dosador), Frasco contendo 100mL (Xarope de Mel c/ seringa dosadora). Reg.:1.3841.0047. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**

**ARPYNFLAN** *Harpagophytum procumbens* 450 mg/com. **INDICAÇÕES:** Este medicamento é indicado para tratamento de quadros reumáticos acompanhado de dor, como artrite, artrose e lombalgia. **CONTRAINDICAÇÕES:** Este medicamento é contraindicado nos casos de úlceras pépticas e duodenais. Também não deve ser administrado por pacientes com hipersensibilidade à raiz de *Harpagophytum procumbens*. Não é recomendada a utilização deste medicamento por mulheres grávidas ou que estão amamentando. De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este medicamento apresenta categoria de risco C. **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** Pacientes com cálculos biliares devem consultar um médico antes da utilização deste medicamento. Doses elevadas deste produto podem interferir com drogas antiarrítmicas e com terapia hipotensiva ou hipertensiva. Além disso, com a utilização de altas doses, em pessoas sensíveis, medicamentos contendo o fitoterápico *Harpagophytum procumbens* podem ocasionar o aparecimento de transtornos digestivos leves, como diarreia, náuseas e dor de estômago. Não existem advertências ou contraindicações específicas quanto ao uso deste medicamento por pacientes idosos. **REAÇÕES ADVERSAS:** O uso de medicamentos contendo *Harpagophytum procumbens* pode levar ao aparecimento de reações indesejáveis como cefaléia frontal, zumbido, anorexia e perda de paladar. Em casos raros, pode ocorrer um efeito laxante no início do tratamento, o qual desaparece espontaneamente após o segundo ou terceiro dia de uso do medicamento. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Nas doses indicadas, não são conhecidas interações medicamentosas. No entanto, não se recomenda a associação deste produto com outros medicamentos sem orientação médica. **POSOLOGIA:** Uso oral. Ingerir 1 (um) comprimido 3 (três) vezes ao dia. **APRESENTAÇÕES:** Cartucho contendo 30 comprimidos revestidos. Reg. MS. 1.3841.0057. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**

**VALESSONE** *Valeriana officinalis* L. 225,75 mg/com. **INDICAÇÕES:** Este medicamento é indicado como sedativo moderado, como agente promotor do sono e no tratamento de distúrbios do sono associados à ansiedade. **CONTRAINDICAÇÕES:** O uso deste medicamento é contraindicado para crianças menores de 3 anos de idade. Pessoas com hipersensibilidade ao extrato de *Valeriana officinalis*, ou de plantas da família Valerianaceae, e aos outros componentes da fórmula não devem usar este medicamento. Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este medicamento apresenta categoria de risco C. **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** Em caso de alergia ao produto, recomenda-se suspender o seu uso e procurar o médico. Não há dados disponíveis acerca do uso de *Valeriana* durante a gravidez e a amamentação. Este medicamento não deve ser usado nessas condições, exceto sob orientação médica. Informe ao seu médico se ocorrer gravidez ou se iniciar amamentação durante o uso deste medicamento. Para crianças de 4 a 12 anos, recomenda-se utilizar produtos contendo *Valeriana* apenas sob supervisão médica. Este medicamento pode causar sonolência, não sendo, portanto, recomendável a sua administração antes de dirigir, operar máquinas ou realizar qualquer atividade de risco que necessite atenção. Não ingerir doses maiores do que as recomendadas. **REAÇÕES ADVERSAS:** Os efeitos adversos relatados pelos voluntários participantes dos ensaios clínicos e tratados com os diferentes extratos secos padronizados de *Valeriana officinalis* foram raros, leves e similares àqueles apresentados pelos grupos tratados com o placebo. Tais efeitos adversos incluem tontura, indisposição gastrointestinal, alergias de contato, dor de cabeça e miíriase. Com o uso em longo prazo, os seguintes sintomas podem ocorrer: cefaléia, cansaço, insônia, miíriase e distúrbios cardíacos. O uso crônico de altas doses de *Valeriana officinalis* por muitos anos aumentou a possibilidade de ocorrência de síndrome de abstinência com a retirada abrupta do medicamento. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** O medicamento a base de *Valeriana officinalis* pode potencializar o efeito de

outros medicamentos depressores do Sistema Nervoso Central. Estudos em animais mostraram um efeito aditivo quando utilizado em combinação com barbitúricos, anestésicos, benzodiazepínicos e outros fármacos depressores do SNC (Sistema Nervoso Central). Recomenda-se evitar o uso deste medicamento juntamente com a ingestão de bebidas alcoólicas pela possível exacerbação dos efeitos sedativos. **POSOLOGIA:** Uso oral. Ingerir 1 comprimido revestido, 2 vezes ao dia. **APRESENTAÇÃO:** Cartucho contendo 20 comprimidos revestidos. Reg. MS. 1.3841.0046. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**

**AFOLIC** Ácido fólico 5 mg/com **INDICAÇÃO:** Este medicamento é destinado à suplementação em casos de deficiência de ácido fólico no organismo e para pessoas que se encontram sob risco de desenvolver carência desta vitamina. Este medicamento é destinado para mulheres que estão em idade de engravidar, para prevenir o nascimento de crianças com defeitos na formação do tubo neural. **CONTRAINDICAÇÕES:** Em casos de alergia ao ácido fólico ou aos demais componentes da fórmula, orienta-se interromper o uso da medicação e procurar orientação médica. Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com anemia perniciosa. Este medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** Em caso de alergia ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. Deve ser administrado com cuidado em pacientes idosos. Problemas com neuropatia estão associados à deficiência de vitamina B12, esta deficiência é prevalente em grupos de idosos. O ácido fólico reverte os sinais hematológicos da deficiência de vitamina B12, porém os efeitos neurológicos permanecem. O ácido fólico deve ser administrado com cautela em pacientes cujas funções renais estejam comprometidas, bem como em pacientes que possam estar com tumores folato dependentes. Deve haver cautela na administração de ácido fólico em pacientes com deficiência de vitamina B12 ou naqueles que já desenvolveram anemia perniciosa. Em ambos os casos, há a possibilidade da ocorrência de lesões neurológicas. **REAÇÕES ADVERSAS:** Os efeitos adversos estão relacionados à ingestão de doses maiores de 15 mg de ácido fólico. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** O uso de medicamentos como metformina, sulfasalazina, triamtereno, metotrexato e antineoplásicos interfere com a utilização do ácido fólico, já que estes medicamentos provocam a redução dos níveis de folato no sangue. Em pessoas que estão sob tratamento com antidepressivos à base de lítio e fluoxetina, medicamentos à base de ácido fólico aumentam a resposta do paciente a estas substâncias. **POSOLOGIA:** AFOLIC Comprimido Revestido 5 mg: deve ser ingerido uma vez ao dia – 1 comprimido a cada 24 horas (dose diária de 5 mg de ácido fólico). **APRESENTAÇÃO:** Afolic 5mg/ com: Cartucho com 20 comprimidos revestidos – Reg. MS.: 1.3841.0050 **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**

**BÊVITER** cloridrato de tiamina 300 mg/com **INDICAÇÃO:** É indicado para tratamento de casos já estabelecidos de carência de vitamina B1. **CONTRAINDICAÇÃO, ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** Em casos de alergia ao produto, recomenda-se descontinuar o uso e consultar o médico. BÊVITER não deve ser administrado por períodos prolongados em doses superiores às recomendadas. Não existem advertências específicas quanto ao uso deste medicamento por idosos. **REAÇÕES ADVERSAS:** Até o momento não foram descritas reações adversas relacionadas com o uso de cloridrato de tiamina por via oral na concentração do BÊVITER. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** O uso prolongado de diuréticos pode levar ao aumento da excreção da tiamina. A ingestão concomitante de medicamentos antiácidos, como géis de alumínio ou silicato, pode levar à degradação da tiamina no trato gastrointestinal ou perda desta vitamina através das fezes. **POSOLOGIA:** Uso oral. Um a dois comprimidos ao dia (cada comprimido contém 300 mg de cloridrato de tiamina, equivalente a 236,02 mg de tiamina). **APRESENTAÇÃO:** Cartucho com 30 cápsulas – Reg.MS.:1.3841.0048. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**

**BUTALAB** sulfato de salbutamol 2,0mg/5mL **INDICAÇÃO:** Alívio do espasmo brônquico associado às crises de asma, bronquite crônica e enfisema. **CONTRAINDICAÇÕES, ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:** O uso de Butalab xarope é contraindicado para pacientes com história de hipersensibilidade a qualquer componente de sua fórmula. O tratamento da asma deve seguir um programa adequado, e a resposta do paciente deve ser monitorada clinicamente e por meio de exames da função pulmonar. O aumento do uso de agonistas de receptores beta2-adrenérgicos de curta ação para alívio dos sintomas indica deterioração do controle da asma. Nessas condições, deve-se reavaliar o esquema terapêutico dos pacientes e considerar a terapia concomitante com corticosteroides. A deterioração repentina e progressiva do controle da asma é potencialmente uma ameaça à vida, devendo-se por isso considerar o início ou o aumento da corticoterapia. Para os pacientes de risco, deve-se instituir o monitoramento diário do pico de fluxo expiratório (PFE). Como podem ocorrer eventos adversos associados a altas dosagens de salbutamol, deve-se alertar os pacientes para não aumentar a dose nem a frequência de administração de Butalab xarope, mesmo que o alívio usual não ocorra ou a duração de ação diminua. Nesse caso, o paciente deve procurar orientação médica. O salbutamol deve ser administrado cuidadosamente a pacientes que sofrem de tireotoxicose. A terapia com agonistas beta2-adrenérgicos pode resultar em hipocalcemia potencialmente grave, sobretudo após administração parenteral ou por nebulização. Recomenda-se cuidado especial na asma aguda grave, uma vez que esse efeito pode potencializar-se pelo tratamento concomitante com xantinas, corticosteroides e diuréticos, assim como pela hipóxia. Em tais situações recomenda-se monitorar os níveis séricos de potássio. Do mesmo modo que outros agonistas beta2-adrenérgicos, Butalab xarope pode induzir alterações metabólicas reversíveis, como aumento dos níveis de glicose sanguínea. O paciente diabético pode ser incapaz de compensar essa condição, havendo relatos sobre o desenvolvimento de cetoacidose. A administração



concomitante de corticosteroides pode aumentar esse efeito. Efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. Nenhum efeito sobre essas atividades foi reportado. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Este produto contém salbutamol, que está incluído na lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidoping. Este medicamento pode causar doping. Este medicamento contém ÁLCOOL no teor de 0,5%. **INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** O salbutamol e as drogas beta-bloqueadoras não seletivas, como o propranolol, não devem ser prescritos para uso concomitante. O salbutamol não é contraindicado para pacientes sob tratamento com inibidores da monoaminooxidase (IMAOs). **REAÇÕES ADVERSAS:** Reações muito comuns e comuns foram geralmente determinadas a partir de dados de estudos clínicos. Reações raras e muito raras foram geralmente determinadas a partir de dados espontâneos. Reação muito comum (>1/10): tremor. Reações comuns (> 1/100 e < 1/10): dor de cabeça; taquicardia; palpitações; câimbras musculares. Reações raras (>1/10.000 e < 1/1.000): hipocalcemia (a terapia com agonistas beta2-adrenérgicos pode resultar em hipocalcemia potencialmente grave); vasodilatação periférica; arritmia cardíaca, que inclui fibrilação atrial, taquicardia supraventricular e extrasístole. Reações muito raras (< 1/10.000): reações de hipersensibilidade, incluindo angioedema, urticária, broncoespasmo, hipotensão e desmaio; hiperatividade; sensação de tensão muscular. **POSOLOGIA :** Butalab xarope tem uma duração de ação de 4 a 6 horas na maioria dos pacientes. O aumento do uso de  $\beta$ -agonistas pode ser um sinal de agravamento da asma. Sob estas condições, uma reavaliação do plano de terapia do paciente pode ser necessária e corticoterapia concomitante deve ser considerada. Como pode haver efeitos adversos associados com a dosagem excessiva, a dose ou frequência de administração só deve ser aumentada por indicação médica. Para alívio do broncoespasmo. Adultos: A dose usualmente eficaz é de 4 mg de salbutamol (10 mL de xarope) 3 ou 4 vezes ao dia. Caso não se obtenha a broncodilatação adequada, cada dose pode ser gradualmente aumentada para até 8 mg (20 mL de xarope). Contudo, observou-se que alguns pacientes obtêm alívio adequado com 2 mg (5 mL de xarope) 3 ou 4 vezes ao dia. Para os pacientes muito sensíveis a estimulantes  $\beta$ -adrenérgicos, recomenda-se iniciar o tratamento com 2 mg (5 mL de xarope) 3 ou 4 vezes ao dia. Crianças: Crianças de 2 a 6 anos: 2,5 a 5 mL de xarope (1 a 2 mg de salbutamol) 3 a 4 vezes ao dia. Crianças de 6 a 12 anos: 5 mL de xarope (2 mg de salbutamol) 3 a 4 vezes ao dia. Crianças acima de 12 anos: 5 a 10 mL de xarope (2 a 4 mg de salbutamol) 3 a 4 vezes ao dia. Pacientes idosos: Recomenda-se iniciar o tratamento com 5 mL de xarope (2 mg de salbutamol) 3 ou 4 vezes ao dia. **APRESENTAÇÃO:** Xarope 0,4mg/mL 100mL sabor framboesa Reg. no M.S.: 1.3841.0019 **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**

**NISTAMAX** Nistatina 100.000 UI/mL **INDICAÇÃO:** NISTAMAX (nistatina) destina-se ao tratamento da candidíase do trato digestivo. É indicado para o tratamento de candidíase da cavidade bucal e do trato digestivo superior - Esofagite por Candida - encontrada em pacientes com moléstias que necessitaram uso prolongado de antibióticos, radioterapia ou drogas imunodepressoras que provocaram queda de resistência orgânica e na Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS). **CONTRAINDICAÇÕES:** É contraindicado para pacientes com história de hipersensibilidade à qualquer um de seus componentes. Advertências e precauções: Nistamax contém propilparabeno e metilparabeno que podem induzir reações alérgicas (as quais podem ser tardias em alguns casos). Nistamax não deve ser usado para o tratamento de micoses sistêmicas. Mesmo que ocorra uma melhora nos sintomas dentro dos primeiros dias do tratamento, você não deve interromper a medicação até o tratamento ser completado de acordo com as orientações do seu médico. **REAÇÕES ADVERSAS:** A nistatina é geralmente bem tolerada por todos os grupos de idade incluindo crianças debilitadas mesmo em terapia prolongada. Você poderá apresentar hipersensibilidade (alergia) e angioedema (inchaço nas camadas mais profundas da pele), incluindo edema facial. Com grandes doses orais você poderá apresentar diarreia, distúrbios gastrointestinais (estômago e intestinos), enjoo e vômitos. Raramente você poderá apresentar erupções cutâneas (pequenas bolhas avermelhadas na pele), incluindo urticária (coceira). Muito raramente você poderá apresentar Síndrome de Stevens-Johnson (formação de edema com bolhas). Interações medicamentosas: Não são conhecidas interações com outros medicamentos e/ou outras substâncias. **Posologia:** Para a aplicação da suspensão oral você deve higienizar a boca de maneira adequada, incluindo os cuidados necessários com a limpeza de próteses dentárias. A suspensão deve ser bochechada e mantida por vários minutos (o maior tempo possível) na boca antes de ser engolida. Nos lactentes (bebês em fase de amamentação) e crianças menores deve-se colocar a metade da dose utilizada em cada lado da boca. Via oral **APRESENTAÇÃO:** Frasco com 50mL - Reg. M.S.: 1.3841.0028 **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**

**RIFOTRAT** rifamicina SV sódica 10mg/mL **INDICAÇÕES:** É destinado ao tratamento tópico das infecções de superfície, causadas por microrganismos sensíveis à rifamicina. Ferimentos e feridas infectadas, queimaduras, furúnculos, infecção da pele, dermatoses, úlceras varicosas, dermatites eczematoides, curativos de feridas pós-cirúrgicas infectadas. **CONTRAINDICAÇÕES/ ADVERTÊNCIAS:** não deve ser utilizado em pacientes que apresentam alergia a rifamicinas ou a qualquer componente da fórmula. **PRECAUÇÕES:** assim como ocorre com outros antibióticos, o uso prolongado de rifamicina pode resultar no crescimento concomitante de organismos não- suscetíveis (particularmente estafilococos). O médico deve avaliar repetidamente suas condições. Se ocorrer superinfecção, o tratamento deve ser interrompido e medidas terapêuticas apropriadas devem ser aplicadas. A administração de rifamicina deve ser restrita a um período de tempo limitado e, sempre que possível, o tratamento deve ser realizado com baixas doses e alternado com outros agentes terapêuticos. Evitar aplicação em áreas extensas, próximo ao interior do ouvido ou em contato com tecido nervoso.

**INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** tem sido relatadas interações com anticoagulantes, ciclosporina e contraceptivos orais com uso sistêmico de rifamicina; também foi observada interação com ciclosporina no tratamento tópico com rifamicina. Caso você esteja utilizando contraceptivos hormonais por via oral ou outras vias sistêmicas, altere para métodos contraceptivos não- hormonais durante o tratamento com o Rifotrat spray. **POSOLOGIA:** deve ser aplicado dentro de cavidade ou para lavagem de cavidade após aspiração do conteúdo purulento (pus), e possibilidade de limpeza com solução salina. Para aplicação externa (para lesões, feridas ou furúnculos) ou para preparação de curativos ou compressas. Pulverizar a área afetada a cada 6-8 horas, ou a critério médico. Para uma aplicação eficaz, pressione repetidamente a válvula, mantendo o frasco em posição vertical ( em pé). **APRESENTAÇÕES:** frasco spray contendo 20 mL. Reg. MS. 1.3841.0022. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.**

#### DIZERES LEGAIS DE FLORATIL®

Floratil® (*Saccharomyces boulardii* CNCM I-745). Indicações: como auxiliar no tratamento de diarreias de diferentes causas e na restauração da flora intestinal. Floratil® AT está indicado na prevenção da diarreia causada por antibióticos, como auxiliar na restauração da flora intestinal e também como auxiliar no tratamento da diarreia causada pelo micróbio *Clostridium difficile*, em decorrência do uso de antibióticos e quimioterápicos. Medicamento isento de prescrição. M.S. 1.3841.0071. Abril /2020.

FLORATIL É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO



#### São Paulo / Escritório

Rua Gomes de Carvalho 1195  
5º andar, Vila Olímpia  
São Paulo - SP  
CEP 04547-004

#### Bahia / Planta Fabril

Rua H no2  
Galpão III, Urbis2  
Santo Antônio de Jesus - BA  
CEP 44574-150

**SAC 0800 7307370**

**faleconosco@natulab.com.br**

**www.natulab.com.br**